

**التمرين الأول: (05 ن)**

الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

(P) معرف بالمعادلة الديكارتية حيث  $x+2y+2z+2=0$

(S) مجموعة النقط  $M(x; y; z)$  من الفضاء والتي تحقق:  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

1- بين ان (S) سطح كرة يطلب تعيين مركزها  $\Omega$  ونصف قطرها  $r$ .

2-  $B(3; 2; 0)$  نقطة من الفضاء .

- تحقق ان  $B$  تنتمي الى (S).

- اكتب المعادلة الديكارتية للمستوي (Q) المماس ل (S) في النقطة  $B$ .

3- بين ان (P) و (Q) متعامدان

4- (D) المستقيم المار من  $C(1; 1; 1)$  والموازي للمستويين (P) و (Q).

- اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D).

- احسب البعد بين النقطة  $\Omega$  والمستقيم (D).

بين ان (D) يقطع (S) في نقطتين. (تحديدهما غير مطلوب)

**التمرين الثاني: (06 ن)**

المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

|| من اجل كل عدد مركب  $z$  نضع:  $p(z) = z^3 + (2\sqrt{2} - 4)z^2 + (8 - 8\sqrt{2})z + 16\sqrt{2}$

1- احسب  $p(-2\sqrt{2})$ .

2- بين ان  $p(z) = (z + 2\sqrt{2})(z^2 + az + b)$  حيث  $a; b$  عدنان حقيقيان يطلب تحديدهما.

3- حل في  $\mathbb{C}$  مجموعة الاعداد المركبة المعادلة  $p(z) = 0$ .

|| نضع النقط  $A; B; C$  التي لواحقها على الترتيب  $Z_A = 2 + 2i, Z_B = 2 - 2i, Z_C = -2\sqrt{2}i$

1- علم النقط  $A; B; C$ .

2- احسب طولية لواحق النقط  $A; B; C$  ثم بين انها تنتمي الى نفس الدائرة ( $\Gamma$ ) يطلب تحديد عناصرها المميزة

3- احسب عمدة العدد المركب  $Z_A$  وعمدة العدد المركب  $Z_B$ . ثم اثبت ان  $(\vec{OB}; \vec{OA}) = \frac{\pi}{2}$

4- عين  $z_D$  لاحقة النقطة  $D$  حيث  $O$  منتصف  $[BD]$

5- بين ان  $\frac{z_B - z_A}{z_D - z_A} = e^{i\frac{\pi}{2}}$  ثم فسر النتيجة

6- لتكن ( $E'$ ) مجموعة النقط  $M$  ذات اللاحقة  $Z$  حيث:  $z = 2\sqrt{2}e^{i\theta}$ .

(أ) تحقق أن النقطة  $D$  تنتمي إلى المجموعة ( $E'$ ).

(ب) عين طبيعة المجموعة ( $E'$ ) ثم أنشئها.

## التمرين الثالث: (09 ن)

(I) دالة عددية لمتغير حقيقي  $x$  معرفة على المجال  $]0, +\infty[$  بالشكل:  $g(x) = 1 - x^2 - \ln(x)$

وليكن  $(C_g)$  منحناها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  ثم  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ .

(2) أدرس تغيرات الدالة  $g$ .

(3) احسب  $g(1)$  واستنتج إشارة  $g$  على  $]0, +\infty[$ .

(II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]0, +\infty[$  بالشكل:  $f(x) = \frac{\ln x}{x} - x + 2$

وليكن  $(C_f)$  منحناها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ثم  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  وفسر النتيجة بيانياً.

(2) بين أنه مهما يكن  $x \in ]0, +\infty[$  فإن  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  ثم استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  وشكل جدول تغيراتها.

(3) (أ) بين أن المستقيم  $(D)$  الذي معادلته:  $y = -x + 2$  هو مستقيم مقارب مائل للمنحني  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$

(ب) ادرس الوضع النسبي بين  $(D)$  و  $(C_f)$

(4) (أ) بين أنه توجد نقطة وحيدة  $B$  يكون عندها المماس للمنحني  $(C_f)$  موازياً لـ  $(D)$  يطلب تعيين إحداثياتها.

(ب) بين أن معادلة المماس  $(\Delta)$  للمنحني  $(C_f)$  في النقطة هي  $y = -x + \frac{1}{e} + 2$  . B

(5) بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha_1$  على المجال  $](0,4);(0,5)[$  وتقبل حلاً وحيداً  $\alpha_2$  على المجال

$](2,2);(2,5)[$  ما ذا تستنتج بيانياً؟

(6) أنشئ المنحني  $(C_f)$  والمستقيمان  $(D)$  و  $(\Delta)$

(7) ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة:  $(m-2)x = \ln x$

وزارة التربية الوطنية		ثانوية جبابري امحمد	
تصحيح الأختبار		السنة الدراسية: 2015 - 2016	
المستوى : 3 ثانوي		عدد الصفحات :	
الشعبة: علوم تجريبية		المادة : رياضيات	

البعد بين النقطة  $\Omega$  والمستقيم  $(D)$ . و بوضع النقطة  $H$  مسقطها العمودي نجد  $\overrightarrow{\Omega H}(2t; -2t; t-1)$  ومنه  $\overrightarrow{\Omega H} \cdot \vec{u} = 0; 4t + 4t + t - 1 = 0; \left(t = \frac{1}{7}\right)$  ومنه  $\Omega H = \frac{\sqrt{44}}{7}$  ومنه  $\overrightarrow{\Omega H} \left(\frac{2}{7}; -\frac{2}{7}; -\frac{6}{7}\right)$  اثبات ان  $(D)$  يقطع  $(S)$  في نقطتين  $r = 3$  و  $\Omega H = \frac{\sqrt{44}}{7} \approx 1$  اذن  $\Omega H < r$  يعني ان  $(D)$  يقطع  $(S)$  في نقطتين .

### التمرين الثاني:

المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

من اجل كل عدد مركب  $z$  نضع :

$$p(z) = z^3 + (2\sqrt{2} - 4)z^2 + (8 - 8\sqrt{2})z + 16\sqrt{2}$$

-1 حساب  $p(-2\sqrt{2})$ .

$$p(-2\sqrt{2}) = (-2\sqrt{2})^3 + (2\sqrt{2} - 4)(-2\sqrt{2})^2 + (8 - 8\sqrt{2})(-2\sqrt{2}) + 16\sqrt{2}$$

$$p(-2\sqrt{2}) = -16\sqrt{2} + 16\sqrt{2} - 32 - 16\sqrt{2} + 32 + 16\sqrt{2} = 0$$

-2 اثبات ان  $p(z) = (z + 2\sqrt{2})(z^2 + az + b)$  حيث  $a, b$  عدنان حقيقيان يطلب تحديدهما.

$$p(z) = z^3 + az^2 + bz + 2\sqrt{2}z^2 + 2\sqrt{2}az + b2\sqrt{2}$$

$$p(z) = z^3 + z^2(a + 2\sqrt{2}) + z(b + 2\sqrt{2}a) + b2\sqrt{2}$$

بالمطابقة نجد  $a = -4; b = 8$

$$p(z) = (z + 2\sqrt{2})(z^2 - 4z + 8)$$

-3 حل في  $\mathbb{C}$  مجموعة الاعداد المركبة المعادلة  $p(z) = 0$ . أي ان  $(z + 2\sqrt{2})(z^2 - 4z + 8) = 0$  ومنه  $z = -2\sqrt{2}$  و  $z^2 - 4z + 8 = 0$  أي  $Z = 2 + 2i$  و  $Z = 2 - 2i$

/// نضع النقط  $C; B; A$  التي لواحقتها على الترتيب

$$Z_C = -2\sqrt{2}i \text{ و } Z_B = 2 - 2i. Z_A = 2 + 2i$$

-1 تعليم النقط  $C; B; A$ .

### التمرين الأول:

الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

$(P)$  معرف بالمعادلة الديكارتيية حيث

$$(P): x + 2y + 2z + 2 = 0$$

$(S)$  مجموعة النقط  $M(x; y; z)$  من الفضاء والتي تحقق

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0:$$

-1 اثبات ان  $(S)$  سطح كرة يطلب تعيين مركزها  $\Omega$  ونصف قطرها  $r$ .

لدينا  $a = -2; b = -2; c = -4; d = -3$  ومنه

$$x_\Omega = -\frac{a}{2} = 1; y_\Omega = -\frac{b}{2} = 1; z_\Omega = -\frac{c}{2} = 2$$

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2 + d = 9 \text{ ومنه } \Omega(1; 1; 2) \text{ و } r = 3$$

-2 نقطة  $B(3; 2; 0)$  من الفضاء .

$$(S): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 3$$

- التحقق ان  $B$  تنتمي الى  $(S)$ . لدينا

$$(3-1)^2 + (2-1)^2 + (0-2)^2 = 3 \text{ محقق}$$

$$B \in (S) \text{ اي}$$

- المعادلة الديكارتيية للمستوي  $(Q)$  المماس ل  $(S)$  في

$$\overrightarrow{\Omega B}(2, 1, -2) \text{ شعاعه الناظمي}$$

ومنه  $B \in (Q)$  يعني ان  $d = -8$  أي

$$(Q): 2x + y - 2z - 8 = 0$$

-3 اثبات ان  $(P)$  و  $(Q)$  متعامدان

$$\vec{n}_{(P)}(1; 2; 2) \text{ و } \overrightarrow{\Omega B}(2, 1, -2) \text{ ومنه}$$

$$(P) \text{ و } \overrightarrow{\Omega B} \cdot \vec{n}_{(P)} = 2 + 2 - 4 = 0 \text{ متعامدان}$$

-4  $(D)$  المستقيم المار من  $C(1; 1; 1)$  و الموازي للمستويين

$$(P) \text{ و } (Q).$$

- تمثيلا وسيطيا للمستقيم  $(D)$ . شعاع توجيهه

$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \overrightarrow{\Omega B} = 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{n}_{(P)} = 0 \end{cases} \text{ يحقق } \vec{u}(a, b, c)$$

$$\begin{cases} 2a + b - 2c = 0 \\ a + 2b + 2c = 0 \end{cases} \text{ ومنه نحل الجملة} \text{ نأخذ } c \text{ ثابت نجد}$$

$$\vec{u}(2, -2, 1) \text{ اذن } b = -2c \text{ و } a = -b$$

$$(D): \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -2t + 1 \\ z = t + 1 \end{cases} \text{ اذن } t \in \mathbb{R}$$

### التمرين الثالث:

(I) دالة عددية لمتغير حقيقي  $x$  معرفة على المجال  $]0, +\infty[$  بالشكل:  $g(x) = 1 - x^2 - \ln(x)$  وليكن  $(C_g)$  منحناها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) تغيرات الدالة  $g$ . نعلم ان

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = -\infty; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 - x^2 - \ln(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - x^2 - \ln(x) = -\infty$$

المشتقة  $g$ : دالة تقبل الاشتقاق ودالتها المشتقة

$$g'(x) = (1 - x^2 - \ln(x))' = -2x - \frac{1}{x} = \frac{-2x^2 - 1}{x}$$

إشارة المشتقة  $g'(x) = 0$  يعني ان  $-2x^2 - 1 = 0$  ومنه  $g'(x) < 0$

جدول التغيرات  $g(1) = 0$

$x$	0	1	$+\infty$
$-2x^2 - 1$		-	
$x$		+	
$g'(x)$		-	
$g(x)$	$+\infty$	0	0

لما  $x \in ]0; 1[$  الدالة  $g(x) > 0$  ولما  $x \in ]1; +\infty[$  فان  $g(x) < 0$

(II) نعتبر الدالة  $f$  معرفة  $]0, +\infty[$  بالشكل:  $f(x) = \frac{\ln x}{x} - x + 2$

(أ) النهايات

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x} - x + 2 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} - x + 2 = -\infty$$

(1). بين أنه مهما يكن  $x \in ]0, +\infty[$   $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  ثم

استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  وشكل جدول تغيراتها.

الدالة  $f$  تقبل الاشتقاق

$$f'(x) = \left( \frac{\ln x}{x} - x + 2 \right)' = -1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

إشارة المشتق  $f'(x)$ : يعني ان  $g(x) = 0$  ومنه  $x = 1$

لدينا  $f(1) = 1$

2- حساب طولية لواحق النقط  $C; B; A$  لدينا

$$|Z_B| = |2 - 2i| = 2\sqrt{2} \text{ و } |Z_A| = |2 + 2i| = 2\sqrt{2}$$


$$|Z_C| = |-2\sqrt{2}i| = 2\sqrt{2}$$

نستنتج ان النقط  $C; B; A$  تنتمي الى نفس الدائرة  $(\Gamma)$  ذات

المركز  $O$  ونصف قطرها  $r = 2\sqrt{2}$

3- عمدة العدد المركب  $Z_A$ :

$$\arg(Z_A) \begin{cases} \cos \theta = \sqrt{2}/2 \\ \sin \theta = \sqrt{2}/2 \end{cases} \theta = \frac{\pi}{4}$$



و عمدة العدد المركب  $Z_B$ :

$$\arg(Z_B) \begin{cases} \cos \theta = \sqrt{2}/2 \\ \sin \theta = -\sqrt{2}/2 \end{cases} \theta = -\frac{\pi}{4}$$

اثبات ان

$$(\vec{OB}; \vec{OA}) = (\vec{OI}; \vec{OA}) - (\vec{OI}; \vec{OB}) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

4- عين  $z_D$  لاحقة النقطة  $D$  حيث  $O$  منتصف  $[BD]$

$$z_D = -2 + 2i \text{ ومنه } \frac{z_D + z_B}{2} = 0$$

5- اثبات ان  $\frac{z_B - z_A}{z_D - z_A} = e^{i\pi/2}$  ومنه

$$\frac{z_B - z_A}{z_D - z_A} = \frac{2 - 2i - 2 - 2i}{-2 + 2i - 2 - 2i} = i = e^{i\pi/2}$$

صرف موجب

تفسير النتيجة المثلث  $ABD$  قائم في  $A$  ومتساوي الساقين

6- لتكن  $(E')$  مجموعة النقط  $M$  ذات اللاحقة  $Z$  حيث

$$z = 2\sqrt{2}e^{i\theta} \text{ . .}$$

(أ) التحقق أن النقطة  $D$  تنتمي إلى المجموعة  $(E')$ .

بما ان  $z_D = 2\sqrt{2}e^{i\theta}$  يعني ان  $-2 + 2i = 2\sqrt{2}e^{i\theta}$

$$D \in (E') \text{ فان } |z_D| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$$

(ب) المجموعة  $(E')$  هي دائرة مركزها  $O$  ونصف

قطرها  $2\sqrt{2}$  ثم أنشئها.

وبما ان  $f(2,2) \times f(2,5) \leq 0$  حسب مبرهنة القيم المتوسطة  
المعادلة  $f(\alpha_2) = 0$  تقبل حلا وحيدا على المجال  
 $\alpha_2 \in ](2,2);(2,5)[$

نستنتج بياننا ان المنحنى  $(C_f)$  يقطع محور الفواصل في  
النقطة ذات الفاصلة  $\alpha_2$  و  $\alpha_1$

(4.) النقطة الوحيدة B يكون عندها المماس للمنحنى  $(C_f)$

موازيا لـ  $(D)$  أي  $f'(x) = -1$  ومنه  $f'(x) + 1 = 0$  ومنه

$$x = e \text{ ومنه } 1 - \ln x = 0$$

(ب) معادلة المماس  $(\Delta)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة B هي :


$$y = -(x - e) + f(e)$$

$$\text{لان } f(e) = \frac{1}{e} - e + 2 = \frac{1 - e^2 + 2e}{e} \text{ ومنه}$$

$$y = -x + \frac{1}{e} + 2 \text{ أي } y = -x + e + \frac{1 - e^2 + 2e}{e}$$

(5.) أنشئ المنحنى  $(C_f)$  والمستقيمان  $(D)$  و  $(\Delta)$

(6.) المناقشة البيانية حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد




حلول المعادلة :  $(m-2)x = \ln x$

$$\text{ومنه } f(x) = -x + m \text{ و } -x + m = \frac{\ln x}{x} - x + 2$$

$$m \in \left] -\infty; \frac{1}{e} + 2 \right[ \text{ المعادلة تقبل حل وحيد}$$

$$m \in \left] \frac{1}{e} + 2; +\infty \right[ \text{ المعادلة لا تقبل حلول}$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	--
$f(x)$			

(2.) اثبات أن المستقيم  $(D)$  الذي معادلته :  $y = -x + 2$

هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$

(ب) ادرس الوضع النسبي بين  $(D)$  و  $(C_f)$  لدينا

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} - x + 2 + x - 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

ومنه  $y = -x + 2$  هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى

(ب) وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة للمستقيم  $(D)$

$$[f(x) - y] = \frac{\ln x}{x} \text{ ومنه } \ln x = 0 \text{ أي ان } x = 1$$

$x \in ]0; 1[$  المنحنى  $(C_f)$  فوق  $(D)$  ولما  $x \in ]1; +\infty[$  المنحنى

$(C_f)$  تحت  $(D)$

(3.) المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا على المجال

$] (0,4); (0,5) [$  بما ان الدالة  $f$  متزايدة على المجال

$]0; 1[$  ومستمرة فهي رتيبة و متزايدة ومستمرة على المجال


$] (0,4); (0,5) [$  فهي رتيبة

وبما ان  $f(0,4) = -0,69$  و  $f(0,5) = 0,11$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة

$f(\alpha_1) = 0$  تقبل حلا وحيدا على المجال

$$\alpha_1 \in ](0,4);(0,5)[$$



بما ان الدالة  $f$  متناقصة ومستمرة على المجال  $]1; +\infty[$  فهي

رتيبة فهي متناقصة ومستمرة على المجال  $] (2,2); (2,5) [$

وهي رتيبة وبما ان  $f(2,2) = 0,11$  و  $f(2,5) = -0,13$