

العُبْقَرِي في الرياضيات

المسؤول عن تحريرات الكود

الثالثة ثانوي

● الشعب: آداب وفلسفة؛
● آداب ولغات أجنبية.

جمع وإعداد الأستاذ: بوعزة مصطفى.

مجلة العبقري في الرياضيات (الدوال كثيرات الحدود)

الملخص // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

ملخص: حول الدوال كثيرات الحدود // التحضير الجيد بكالوريا // الشعبة: آوف؛ لغ أ.

① دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة (III) الأهم

$a \neq 0$ ، b ، c و d أعداد حقيقية،

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

f دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة

① النهايات

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (ax^3) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax^3) = -\infty$$

$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (ax^3) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax^3) = +\infty$$

② اتجاه تغير الدالة f

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما)

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما)

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

كيف نحسب المشتقة: (الواردة في البكالوريات)

$f'(x) =$	القاعدة	$f(x) =$	بكالوريا
$f'(x) = 3x^2 - 3$	$kx^n \rightarrow$ تصبح بعد الاشتقاق knx^{n-1}	$f(x) = x^3 - 3x$	2008، م 01
$f'(x) = x^2 - 4x + 3$		$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$	2008، م 02
$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$		$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 5$	2010، م 01
$f'(x) = 3x^2 + 3$		$g(x) = x^3 + 3x + 4$	2010، م 02
$f'(x) = x^2 - 2x - 3$		$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 3$	2011، م 02
$f'(x) = -3x^2 + 6x$		$f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$	2012، م 01
$f'(x) = 3x^2 - 8x + 4$		$f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$	2013، م 01
$f'(x) = 3x^2 - 3$		$f(x) = x^3 - 3x + 2$	2015، م 02
$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$		$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$	2016، م 02
$f'(x) = x^2 - 4$		$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$	2017، م 02
$f'(x) = -3x^2 - 6x$		$f(x) = -x^3 - 3x^2 + 4$	2017، م 02
$f'(x) = 3x^2 - 6x$		$f(x) = x^3 - 3x^2$	2018، م 01
$f'(x) = 6x^2 + 6x$		$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5$	2019، م 02

④ معادلة المستقيم (Δ) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة x_0

معادلة المستقيم (Δ) من الشكل $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ حيث $f'(x_0)$ هو معامل توجيه المماس (Δ) .

من البيان

ويُمكن إيجاد $f'(x_0)$ من البيان باختيار نقطتين من المماس $N(x_N; y_N)$ و $M(x_M; y_M)$

$$f'(x_0) = \frac{y_M - y_N}{x_M - x_N} \text{ نجد:}$$

كما يُمكن إيجاد معادلة المماس (Δ) من البيان وذلك باتّباع ما يلي:

$$(1) \text{ نحسب } a: a = f'(x_0) = \frac{y_M - y_N}{x_M - x_N}$$

$$(2) \text{ ثمّ نحسب } b: b \text{ هو ترتيب نقطة تقاطع المماس } (\Delta) \text{ مع محور الترتيب } (b = y_N - ax_N)$$

$$\text{أو } b = y_M - ax_M \text{ في الأخير نجد: } y = ax + b: (\Delta)$$

ولدراسة وضعيّة (C_f) بالنسبة إلى مماسه (Δ) : (ندرس إشارة الفرق $f(x) - y$)

أو كان الفرق من الشكل $f(x) - y = (x + 1)^3$

(ندرس إشارة $(x + 1)$)

نُلخص الوضع النسبي في جدول

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$x + 1$	-	○	+
$f(x) - y$	-	○	+
الوضعية النسبية	(C_f) يقع تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) يقع فوق (Δ)

مثلاً إذا كان الفرق من الشكل $f(x) - y = x^3$

(ندرس إشارة x)

نُلخص الوضع النسبي في جدول

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	-	○	+
$f(x) - y$	-	○	+
الوضعية النسبية	(C_f) يقع تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) يقع فوق (Δ)

ملاحظة:

- بمّا المنحنى (C_f) غيّر وضعيته بالنسبة إلى مماسه (Δ) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 (لتكن هذه النقطة E) نقول أنّ المنحنى (C_f) يخترق المماس (Δ) في النقطة E ونستنتج أنّ النقطة $E(x_0; f(x_0))$ هي نقطة انعطاف لـ (C_f) .

⑤ نقطة الإنعطاف

لتبيان أنّ $E(x_0; y_0)$ هي نقطة انعطاف لـ (C_f) نتبع ما يلي:

(1) نحسب $f''(x)$ (انطلاقاً من $f'(x)$)

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماماً)

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماماً)

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

(2) ندرس إشارة $f''(x)$ (نضع $f''(x) = 0$ نجد $x = x_0$)

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماماً)

إشارة $f''(x)$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f''(x)$	+	○	-

$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماماً)

إشارة $f''(x)$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f''(x)$	-	○	+

$f''(x)$ انعدمت عند x_0 مُغَيَّرَة إشارتها إذن $E(x_0; f(x_0))$ نقطة انعطاف لـ (C_f) وهي $E(x_0; y_0)$.

ملاحظة:

إذا طُلب منا تبين أن $f(x) = (\dots)(\dots)$ من الطرف الثاني $(\dots)(\dots)$ باستعمال النشر نصل إلى الطرف الأول $f(x)$ ، نستعملها في حل معادلة $f(x) = 0$.

6 تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات ☺

أ-تقاطع (C_f) مع حامل محور الترتيب

نحل المعادلة $f(x) = 0$ [حسب اختيار $f(x)$]
نكون أمام (02) حالتين إما:

الحالة 01: إذا كان $d = 0$ نختار عبارة $f(x)$ الموجودة في المعطيات ونقوم بإخراج x كعامل مشترك (ثم نحل معادلة جداء)
الحالة 02: إذا كان $d \neq 0$ نختار عبارة $f(x)$ الموجودة في الأسئلة (ثم نحل معادلة جداء)
ملاحظة مهمة: عدد الحلول هو عدد نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

أ-تقاطع (C_f) مع حامل محور الترتيب



نحسب $f(0) = d$ نجد $f(0) = d$

$$(C_f) \cap (yy') = \{A(0; d)\}$$

نسمي نقطة التقاطع A إن لم تذكر في التمرين

7 التمثيل البياني للدالة f (رسم (C_f)) ☺

بصفة عامة: نُعين مجموعة من النقط $M(x; f(x))$ ونصل بينها باليد نحصل على المنحنى (C_f) .



8 إضافات (أسئلة طُرحت في البكالوريا) 📌

السؤال	كيفية الإجابة عليه
(1) عَيِّن نقطتي تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (D) ذي المعادلة: $y = 3x - 1$.	نحل المعادلة $f(x) = 3x - 1$ نجد حلين x_1 و x_2 . وبالتالي: $(C) \cap (D) = \{A(x_1; y_1); B(x_2; y_2)\}$ لإيجاد y_1 نعوض x_1 في عبارة f أو في معادلة (D) .
(2) حل بيانيا المتراجحة ذات المجهول الحقيقي x : $f(x) < -1$.	حلول المتراجحة $f(x) < -1$ هي فواصل نقط (C_f) الواقعة تحت المستقيم ذو المعادلة $y = -1$ باستثناء فواصل نقط التقاطع، من البيان نجد $S = \dots$.
(3) عَيِّن $f'(1)$ و $f'(-1)$, Bac2010	(أ) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 مُوازيًا لمحور الفواصل يعني $f'(1) = 0$.

(ب) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1- كذلك مُوازيًا لمحور الفواصل يعني $f'(-1) = 0$.	(4) يبين أنّه يوجد مماسان للمنحنى (C_f) معامل توجيه كل منهما يساوي 5. Bac2011
نحل المعادلة $f'(x) = 5$ نجد حلين.	

2 دالة كثير حدود من الدرجة الثانية (II)

$a \neq 0$ و b, c أعداد حقيقية،	$f(x) = ax^2 + bx + c$ $D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$	f دالة كثير حدود من الدرجة الثانية
--	---	--

1 النهايات

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (ax^2) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax^2) = -\infty$	$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (ax^2) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax^2) = +\infty$
--	--

2 اتجاه تغيير الدالة f

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما) $f'(x) = 2ax + b$	$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما) $f'(x) = 2ax + b$
--	--

تذكير: إشارة $\alpha x + \beta$

x	$-\infty$	$-\frac{\beta}{\alpha}$	$+\infty$
$\alpha x + \beta$	مثل إشارة α	عكس إشارة α	مثل إشارة α

بصفة عامة: لدينا $f'(x)$ من الشكل $\alpha x + \beta$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	مثل إشارة a	عكس إشارة a	مثل إشارة a

إشارة $f'(x)$ نضع $f'(x) = 0$ نجد $x = -\frac{b}{2a}$			
x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	-
f متزايدة تماما على المجال $]-\infty; -\frac{b}{2a}]$ ومتناقصة تماما على المجال $[-\frac{b}{2a}; +\infty[$			

إشارة $f'(x)$ نضع $f'(x) = 0$ نجد $x = -\frac{b}{2a}$			
x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	○	+
f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; -\frac{b}{2a}]$ ومتزايدة تماما على المجال $[-\frac{b}{2a}; +\infty[$			

3 جدول تغييرات الدالة f

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما)			
x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(-\frac{b}{2a})$	$-\infty$

$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما)			
x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	○	+
$f(x)$	$+\infty$	$f(-\frac{b}{2a})$	$+\infty$

④ معادلة المستقيم (Δ) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة x₀

معادلة المستقيم (Δ) من الشكل $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ حيث $f'(x_0)$ هو معامل توجيه المماس (Δ).

من البيان

ويمكن إيجاد $f'(x_0)$ من البيان باختيار نقطتين من المماس $M(x_M; y_M)$ و $N(x_N; y_N)$

$$\text{نجد: } f'(x_0) = \frac{y_M - y_N}{x_M - x_N}$$

كما يُمكن إيجاد معادلة المماس من البيان (سنشرح هذا الفصل في الدّالة كثير حدود من الدرجة الثالثة)

ملاحظة:

إذا طُلب منا تبين أن $f(x) = (\dots)(\dots)$ ننطلق من الطرف الثاني $(\dots)(\dots)$ باستعمال النشر نصل إلى الطرف الأول $f(x)$ ، نستعملها في حل معادلة $f(x) = 0$.

⑥ تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات ☺

ب-تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل

نحل المعادلة $f(x) = 0$ [حسب اختيار $f(x)$]
تكون أماما ثلاث (03) حالات إما:
الحالة 01: للمعادلة حلين متمايزين x' و x''

$$(C_f) \cap (xx') = \{B(x'; 0); C(x''; 0)\}$$

الحالة 02: للمعادلة حل مضاعف x'

$$(C_f) \cap (xx') = \{B(x'; 0)\}$$

الحالة 03: المعادلة ليس لها حلول $(C_f) \cap (xx') = \{ \}$

أ-تقاطع (C_f) مع حامل محور الترتيب



نحسب $f(0) = c$ نجد

$$(C_f) \cap (yy') = \{A(0; c)\}$$

نسمي نقطة التقاطع A إن لم تُذكر في التمرين

⑦ التمثيل البياني للدّالة f (رسم (C_f)) ☺

بصفة عامة: نُعين مجموعة من النقط $M(x; f(x))$ ونصل بينها باليد نحصل على المنحنى (C_f).



3 دالة كثير حدود من الدرجة الأولى (I)

a و b عددين حقيقيين، $a \neq 0$

$$f(x) = ax + b$$

$$D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

f دالة كثير حدود من الدرجة الأولى

1 النهايات

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (ax) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax) = -\infty$$

$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (ax) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax) = +\infty$$

2 اتجاه تغيير الدالة f

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما)

$$f'(x) = a < 0$$

f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما)

$$f'(x) = a > 0$$

f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

3 جدول تغييرات الدالة f

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما)

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما)

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

6 تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات

ب-تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل

نحل المعادلة $f(x) = 0$ نجد $x = -\frac{b}{a}$

$$(C_f) \cap (xx') = \left\{ B\left(-\frac{b}{a}; 0\right) \right\}$$

نسمي نقطة التقاطع B إن لم تذكر في التمرين

أ-تقاطع (C_f) مع حامل محور الترتيب

نحسب $f(0) = b$ نجد

$$(C_f) \cap (yy') = \{A(0; b)\}$$


نسمي نقطة التقاطع A إن لم تذكر في التمرين

7 التمثيل البياني للدالة f (رسم (C_f))


بصفة عامة: منحناها عبارة عن مستقيم ولرسم هذا المستقيم نستعمل جدول مساعد

x		
y		

$a < 0$ (a عدد حقيقي سالب تماما)



$a > 0$ (a عدد حقيقي موجب تماما)



مجلة العبقري في الرياضيات (الدّوال كثيرات الحدود -بكالوريا
جزائرية) التمارين // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

التمرين 01: (09 نقاط) بكالوريا 2008 // الموضوع 01 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^3 - 3x$.

(C_f) المنحنى الممثل للدالة f في مستو منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) احسب $f(-1)$ ، $f(-2)$.

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(ب) احسب $f'(x)$ ثم أدرس إشارتها.

(ج) شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

(3) أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.


(ب) استنتج أنّ المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في ثلاث نقاط يُطلب تعيين إحداثيي كل منها.

(ج) اكتب معادلة للمستقيم (Δ) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة التي فاصلتها 0.

ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ). ماذا تستنتج؟

(د) أرسم (C_f) و (Δ).

التمرين 02: (10 نقاط) بكالوريا 2008 // الموضوع 02 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.



المنحنى (C) المرسوم في الشكل المقابل هو لدالة f معرفة على المجال $[-1; +\infty[$ و (Δ) مماس للمنحنى (C) عند النقطة التي فاصلتها 2.

- (1) خمن نهاية f عند $+\infty$ ، ثم بقراءة بيانية عيّن اتجاه تغيّر f على المجال $[-1; +\infty[$. شكل جدول تغيّرات f .
- (2) من العبارات الآتية:

$$f_1(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$$

$$f_2(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

$$f_3(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

عيّن العبارة المناسبة للدالة f مبرراً ذلك.

- (3) ادرس تغيّرات الدالة f . هل تخميناتك وقراءتك السابقة صحيحة؟

- (4) عيّن معادلة للمستقيم (Δ) .

- (5) عيّن إحداثيي نقطة الانعطاف للمنحنى (C).

- (6) ارسم المستقيم ذو المعادلة $y = -1$ ، ثم حل بيانياً المتراجحة ذات المجهول الحقيقي x :

$$f(x) < -1$$

- (7) عيّن نقطتي تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (D) ذي المعادلة $y = 3x - 1$.

التمرين 03: (09 نقاط) بكالوريا 2010 // الموضوع 01 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 5$.

ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

$$1. \text{ أحسب } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x).$$

2. ادرس اتجاه تغيّرات الدالة f ثم شكل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن النقطة $I\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ هي نقطة انعطاف للمنحنى (C_f) .

4. أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة I .

5. تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = (x - 1)^2(2x - 5)$.

ثم استنتج نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

6. أرسم (Δ) و (C_f) .

التمرين 04: (06 نقاط) بكالوريا 2010 // الموضوع 02 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.


في كل من الأسئلة الآتية، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الثلاث المقترحة، مع التعليل.

1. 2. الحساب

3. g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 + 3x + 4$ و (C_g) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم.

- (1) الدالة g : أ) متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ (ب) متناقصة تماما على $\mathbb{R}$ (ج) ليست رتيبة على $\mathbb{R}$.
(2) (C_g) يقبل نقطة انعطاف إحداثياتها: أ) $(-1; 0)$ ب) $(0; 4)$ ج) $(0; 0)$.

التمرين 05: (07 نقاط) بكالوريا 2010 // الموضوع 02 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.




f دالة عددية معرفة على المجال $[-2; 2]$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد متجانس.

انظر الشكل وأجب عن الأسئلة التالية:

- أ- عيّن $f'(1)$ و $f'(-1)$ (هي الدالة المشتقة للدالة f)
ب- عيّن صورتَي العددين (-1) و (-2) بواسطة الدالة f .
ج- شكّل جدول تغيّرات الدالة f على المجال $[-2; 2]$.
2. باستعمال اتجاه تغيّر الدالة f ، قارن العددين $f(\sqrt{3})$ و $f(\frac{3}{2})$.
3. A هي النقطة من المنحنى (C_f) التي إحداثياتها $(0; -2)$ ، وبفرض أنّ $f'(0) = 3$ ؛ اشرح كيف يُمكن رسم مماس المنحنى (C_f) في النقطة A ثم ارسمه بعد نقل الشكل.

التمرين 06: (08 نقاط) بكالوريا 2011 // الموضوع 02 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.



أ) في الشكل المقابل، (C_g) هو التمثيل البياني في مستو منسوب

إلى معلم متعامد ومتجانس للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$

بالعبارة: $g(x) = -x^2 + 2x + 3$.

بقراءة بيانية:

1. شكّل جدول تغيّرات الدالة g على $\mathbb{R}$.
2. عيّن حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.
- ب) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة:
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 3$
(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
1. بيّن أنّ: $f'(x) = -g(x)$ ثم استنتج إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$.
2. احسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.
3. احسب $f(3)$ ، $f(-1)$ ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

4. بيّن أنّه يوجد مماسّان للمنحنى (C_f) معامل توجيه كلّ منهما يساوي 5.

5. حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x) = g(x)$ ثم استنتج احداثيات نقط تقاطع المنحنيين (C_g) و (C_f) .

التمرين 07: (08 نقاط) بكالوريا 2012 // الموضوع 01 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

نعتبر الدّالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$

(C) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. احسب نهاية الدّالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

2. احسب $f'(x)$ ثم ادرس إشارته. f' الدّالة المشتقة للدّالة f

3. شكّل جدول تغيّرات الدّالة f .

4. أ) اكتب معادلة للمستقيم (Δ) المماس للمنحنى (C) في النقطة ذات الفاصلة 1.

ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي $x: f(x) - (3x - 5) = -(x - 1)^3$.

ج) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C) والمستقيم (Δ) .


5. احسب $f(-1)$ ثم أنشئ المماس (Δ) والمنحنى (C).

التمرين 08: (08 نقاط) بكالوريا 2013 // الموضوع 01 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

في الشكل المقابل، المنحنى (C) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$$

والمستقيم (Δ) هو مماس للمنحنى (C) عند مبدأ المعلم O ، حيث: $y = g(x)$ معادلة له.



I) بقراءة بيانية، عيّن:

- 1- عدد نقط تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل.
- 2- إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.
- 3- عدد حلول المعادلة: $f(x) = g(x)$.

II) باستعمال عبارة الدالة f :

- 1- أ) احسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
- ب) احسب $f'(x)$ ، ثم ادرس إشارتها.
- ج) شكّل جدول تغيرات الدالة f .
- 2- أ) أثبت أنه، من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = x(x-2)^2$.
- ب) عيّن إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل.

3- أ) بيّن أن: $g(x) = 4x$.


ب) عيّن فواصل نقط تقاطع (C) مع (Δ) .

4- بيّن أن، (C) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها $\frac{4}{3}$.

5- عيّن بيانياً، مجموعة قيم الوسيط الحقيقي m ، التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = m$ ثلاثة حلول متميزة.

التمرين 09: (08 نقاط) بكالوريا 2014 // الموضوع 02 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني (C_f) في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ و (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة $A(1; 3)$ كما في الشكل:



I) بقراءة بيانية:

- (1) خمن نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
- (2) أدرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$ وشكل جدول تغيراتها.
- (3) أ) اكتب معادلة للمماس (T) .
ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمماس (T) .
ثم استنتج أنّ A هي نقطة الانعطاف للمنحنى (C_f) .
- (4) عيّن حلول المتراجحة: $f(x) > 5$.

II) إذا علمت أنّ f معرفة على $\mathbb{R}$ بالشكل:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + b \text{ حيث } a \text{ و } b \text{ عددين حقيقيين.}$$

- (1) عيّن العددين a و b .
- (2) تحقّق من صحة إجاباتك السابقة حول:
أ) اتجاه تغير الدالة f .
ب) معادلة المماس (T) .
ج) نقطة الانعطاف A .
د) حلول المتراجحة: $f(x) > 5$.

التمرين 10: (08 نقاط) بكالوريا 2015 // الموضوع 02 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

(C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- (1) احسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
- (2) ادرس اتجاه تغير الدالة f ؛ ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (3) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثيها.
- (4) اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.
- (5) احسب $f(-2)$ و $f(2)$ ؛ ثم أنشئ (T) و (C_f) .
- (6) أ) أنشئ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 2$.
ب) حل، في $\mathbb{R}$ ، بيانيا المتراجحة $f(x) \geq x + 2$.

التمرين 11: (08 نقاط) بكالوريا 2016 // الموضوع 02 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- (1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- (2) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = (3x - 3)(x - 3)$.

- (ب) ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
- (3) أ) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة E ذات الفاصلة 2.
 (ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي $x: f(x) - (-3x + 8) = (x - 2)^3$.
 (ج) استنتج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة الى المماس (T) .
 (د) برّر أنّ E نقطة انعطاف للمنحنى (C_f) .
- (4) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي $x: f(x) = x(x - 3)^2$.
 (ب) جد إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل حور الفواصل.
 (5) احسب $f(4)$ ثم أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) .

التمرين 12: (08 نقاط) بكالوريا 2017_د01 // الموضوع 02 // الشعبة: آ وفلسفة؛ لغ أ.

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$.
- (1) (C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- (2) احسب النهايتين التاليتين: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- (3) أ) بيّن أنّ: من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = (x - 2)(x + 2)$.
 (ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f .
 (3) شكّل جدول تغيّرات الدالة f .
- (4) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$ ، استنتج إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامي محوري الإحداثيات.
- (5) بيّن أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف هي مبدأ المعلم.
- (6) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
- (6) ارسم (T) والمنحنى (C_f) .

التمرين 13: (08 نقاط) بكالوريا 2017_د02 // الموضوع 02 // الشعبة: آ وفلسفة؛ لغ أ.

- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 4$.
- (1) (C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- (2) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- (3) تحقّق أنّ: من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = (-x + 1)(x + 2)^2$ ثم جد إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامي محوري الإحداثيات.
- (4) ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
- (5) بيّن أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف E إحداثياتها $(-1; 2)$.
- (6) اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة E .
- (6) ارسم (Δ) و (C_f) .

التمرين 14: (08 نقاط) بكالوريا 2018 // الموضوع 01 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

- f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x^2$
- و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- (1) احسب نهاية الدّالة f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$.
- (2) أ) احسب $f'(x)$ ثم ادرس إشارتها.
ب) استنتج اتجاه تغيّر الدّالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
- (3) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين احداثيتها.
- (4) اكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.
- (5) أ) تحقّق من أنّ النقطة O (مبدأ المعلم) والنقطة A ذات الفاصلة 3 هما نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.
ب) ارسم المماس (T) والمنحنى (C_f) .
- (6) حل في $\mathbb{R}$ بيانيا المتراحة: $f(x) > 0$.
- (7) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي $x: f(x) + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$ ، ثم حل المعادلة $f(x) = -4$.

التمرين 15: (04 نقاط) بكالوريا 2019 // الموضوع 02 // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

- f الدّالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- (1) احسب نهايتي الدّالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
 - (2) أ) احسب $f'(x)$ ، ثم ادرس إشارتها على $\mathbb{R}$. (f' تُرمز إلى الدّالة المشتقة الأولى للدّالة f)
ب) احسب $f(0)$ و $f(-1)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدّالة f .
 - (3) أ) تحقّق أنّه: من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = (x - 1)(2x^2 + 5x + 5)$.
ب) عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.
 - (4) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها $\left(-\frac{1}{2}\right)$ ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة A .
 - (5) أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) .
 - (6) حل بيانيا المتراحة: $f(x) \geq 0$.

مجلة العبقري في الرياضيات (الدوال كثيرات الحدود - الكالوريات
جزائرية) الحلول // الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أجنبية.

حل التمرين 01: (09 نقاط) بكالوريا 2008 // الموضوع 01 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: $f(x) = x^3 - 3x$ و $D_f = \mathbb{R}$

(1) حساب $f(-2)$ ؛ $f(-1)$ ؛

بالتعويض نجد:

$$f(-2) = (-2)^3 - 3(-2) = -8 + 6 = -2$$

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = +2$$

(2) حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ؛ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ؛

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3) = +\infty$$

(ب) حساب $f'(x)$ ثم دراسة إشارتها:

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ؛ ولدينا: $f'(x) = 3x^2 - 3$

دراسة إشارة $f'(x)$ ؛

$$\text{نضع: } f'(x) = 0 \text{ نجد: } 3x^2 - 3 = 0$$

$$\text{ومنه: } x^2 = 1$$

$$\text{وعليه: } x = \sqrt{1} = 1 \text{ أو } x = -\sqrt{1} = -1$$

وبالتالي:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+

(ج) تشكيل جدول تغيرات الدالة f ؛

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$

حيث: $f(-1) = 2$ و $f(1) = (1)^3 - 3(1) = 1 - 3 = -2$

(3) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$ ؛

$$f(x) = 0 \text{ معناه: } x^3 - 3x = 0$$

$$\text{ومنه: } x(x^2 - 3) = 0$$

$$\text{وعليه: } x = 0 \text{ أو } x^2 - 3 = 0$$

$$\text{ويكون: } x = 0 \text{ أو } x^2 = 3$$

وبالتالي: $x = 0$ أو $x = \sqrt{3}$ أو $x = -\sqrt{3}$ ؛ إذن: $S = \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\}$

مجلة العبقري في الرياضيات (الدّوال كثيرات الحدود -كالوريات جزائرية) الحلول _ الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

(ب) استنتاج أن المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في ثلاث نقاط يُطلب تعيين إحداثي كل منها:

بمأن: للمعادلة $f(x) = 0$ ثلاث حلول في $\mathbb{R}$ ،

فإن: المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في ثلاث نقاط إحداثيها هي: $(\sqrt{3}; 0)$ ؛ $(0; 0)$ و $(-\sqrt{3}; 0)$.

(ج) كتابة معادلة للمستقيم (Δ) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة التي فاصلتها 0:

معادلة (Δ) من الشكل: $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

ولدينا: $\begin{cases} f'(0) = 3(0)^2 - 3 = -3 \\ f(0) = (0)^3 - 3(0) = 0 \end{cases}$ بالتعويض نجد: $(\Delta): y = -3x$.

دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) : (ندرس إشارة الفرق $f(x) - y$)

لدينا: $f(x) - y = (x^3 - 3x) - (-3x) = x^3$


إشارة الفرق $f(x) - y$ من إشارة x .

وبالتالي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	-	○	+
$f(x) - y$	-	○	+
الوضع النسبي	(C_f) يقع تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) يقع فوق (Δ)

الإستنتاج: النقطة ذات الفاصلة 0 نقطة انعطاف لـ (C_f) .

(د) رسم (C_f) و (Δ) :



حل التمرين 02: (10 نقاط) بكالوريا 2008 // الموضوع 02 // الشعبة: آوف؛ لغ أ.

لدينا: المنحنى (C) هو لدالة f معرفة على المجال $[-1; +\infty[$

و (Δ) مماس للمنحنى (C) عند النقطة التي فاصلتها 2.

(1) تخمين نهاية f عند $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

بقراءة بيانية:

تعيين اتجاه تغير f على المجال $[-1; +\infty[$:

من البيان: f متزايدة تماما على كل من المجالين $[-1; 1]$ و $[3; +\infty[$ و متناقصة تماما على المجال $[1; 3]$.

تشكيل جدول تغيرات f :

من البيان:

x	-1	1	3	$+\infty$
$f(x)$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
	$-\frac{19}{3}$		-1	

(2) من العبارات الآتية: $f_1(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$

$$f_2(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

$$f_3(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

تعيين العبارة المناسبة للدالة f مع التبرير:

■ لدينا: $f(0) = -1$ وبمأن: $f_2(0) = +1$ فإن: $f(x) \neq f_2(x)$.

■ ولدينا: $f(1) = \frac{1}{3}$ وبمأن:

$$f_3(1) = -\frac{1}{3}(1)^3 - 2(1)^2 + 3(1) - 1 = -\frac{1}{3} - 2 + 3 - 1 = \frac{-1-6+9-3}{3} = -\frac{1}{3} \neq \frac{1}{3}$$

فإن: $f(x) \neq f_3(x)$.

■ إذن: $f(x) = f_2(x)$.

ملاحظة: توجد طرق أخرى.

(3) دراسة تغيرات الدالة f :

لدينا: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ و $D_f = [-1; +\infty[$

■ لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}x^3\right) = +\infty$

$$\text{و } f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - 2(-1)^2 + 3(-1) - 1 = \frac{-1}{3} - 2 - 3 - 1 = \frac{-1-6-9-3}{3} = \frac{-19}{3}$$

■ f قابلة للاشتقاق على $[-1; +\infty[$ ، ولدينا: $f'(x) = x^2 - 4x + 3$.

إشارة $f'(x)$:

$$\text{نضع: } f'(x) = 0 \text{ نجد: } x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(1)(3) = 16 - 12 = 4 > 0$$

للمعادلة حلين متمايزين هما:

$$x' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) + \sqrt{4}}{2(1)} = \frac{4+2}{2} = 3 \text{ و } x'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) - \sqrt{4}}{2(1)} = \frac{4-2}{2} = 1$$

وبالتالي:

x	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$		○	○	
$f(x)$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
	$-\frac{19}{3}$		-1	

نعم تخميناتي وقرأتي السابقة صحيحة.

(4) تعيين معادلة للمستقيم (Δ) :

ط01 حسابياً:

لدينا: (Δ) مماس للمنحنى (C) عند النقطة التي فاصلتها 2،

ومنه: معادلة (Δ) من الشكل: $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$

$$f'(2) = (2)^2 - 4(2) + 3 = -1$$

$$f(2) = \frac{1}{3}(2)^3 - 2(2)^2 + 3(2) - 1 = \frac{8-24+18-3}{3} = \frac{-1}{3}$$

$$\text{بالتعويض نجد: } y = -(x - 2) - \frac{1}{3} \text{ ومنه: } y = -x + 2 - \frac{1}{3} \text{ إذن: } (\Delta): y = -x + \frac{5}{3}$$

ط02 بيانياً:

(5) تعيين إحداثيي نقطة الانعطاف للمنحنى (C) :

$$\text{لدينا: } f''(x) = 2x - 4$$

إشارة $f''(x)$:

$$\text{نضع: } f''(x) = 0 \text{ نجد: } 2x - 4 = 0 \text{ ومنه: } x = 2$$

وبالتالي:

x	-1	2	$+\infty$
$f''(x)$	-	$\bigcirc$	+

نلاحظ أنّ $f''(x)$ تنعدم عند 2، وتُغيّر إشارتها إذن: النقطة $\omega(2; f(2))$ أي: $\omega(2; -\frac{1}{3})$ نقطة انعطاف لـ (C) .

(6) رسم المستقيم ذو المعادلة $y = -1$ ، ثم حل بيانياً المتراجحة ذات المجهول الحقيقي x : $f(x) < -1$ ؛
حلول المتراجحة $f(x) < -1$ بيانياً هي فواصل نقاط المنحنى (C) الواقعة تحت المستقيم ذو المعادلة $y = -1$ ، باستثناء فواصل نقاط التقاطع.

$$\text{من البيان نجد: } S = [-1; 0[$$

(7) تعيين نقطتي تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (D) ذي المعادلة $y = 3x - 1$:

ط01 حسابياً:

نحل المعادلة $f(x) = y$:

$$\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1 = 3x - 1 \text{ معناه: } f(x) = y$$

$$\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 = 0 \text{ ومنه:}$$

$$x^2 \left(\frac{1}{3}x - 2 \right) = 0 \text{ وعليه:}$$

$$\frac{1}{3}x - 2 = 0 \text{ أو } x^2 = 0 \text{ ويكون:}$$

$$x = 6 \text{ أو } x = 0 \text{ وبالتالي:}$$

إذن: يتقاطع (C) مع (D) في نقطتين هما: $A(0; -1)$ و $B(6; 17)$.

ط02 بيانياً:

حل التمرين 03: (09 نقاط) بكالوريا 2010 // الموضوع 01 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 5$ و $D_f = \mathbb{R}$.

1. حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3) = +\infty$$

2. دراسة اتجاه تغيرات الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها:

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

دراسة إشارة $f'(x)$:

$$f'(x) = 0 \text{ أي: } 6x^2 - 18x + 12 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-18)^2 - 4(6)(12) = 324 - 288 = 36 > 0$$

للمعادلة حلين متمايزين هما:


$$x' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-18) + \sqrt{36}}{2(6)} = \frac{18 + 6}{12} = 2 \text{ و } x'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-18) - \sqrt{36}}{2(6)} = \frac{18 - 6}{12} = 1$$

وبالتالي:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+		-		+

إذن: f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty; 1]$ و $[2; +\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[1; 2]$.

ويكون جدول تغيراتها كالتالي:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	○	-	○	+
$f(x)$					

حيث: $f(1) = 0$ و $f(2) = -1$.

3. تبين أن النقطة $I\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ هي نقطة انعطاف للمنحنى (C_f) :

$$f''(x) = 12x - 18$$

إشارة $f''(x)$:

$$f''(x) = 0 \text{ نجد: } 12x - 18 = 0 \text{ ومنه: } x = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

وبالتالي:

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	○	+

نلاحظ أنّ $f''(x)$ تنعدم عند $\frac{3}{2}$ ، وتُغيّر إشارتها إذن: النقطة $I\left(\frac{3}{2}; f\left(\frac{3}{2}\right)\right)$ أي: $I\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ نقطة انعطاف

لـ (C_f) .

4. كتابة معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة $I: (x_0 = \frac{3}{2})$

معادلة (Δ) من الشكل: $y = f' \left(\frac{3}{2} \right) \left(x - \frac{3}{2} \right) + f \left(\frac{3}{2} \right)$

$$\begin{cases} f' \left(\frac{3}{2} \right) = 6 \left(\frac{3}{2} \right)^2 - 18 \left(\frac{3}{2} \right) + 12 = 6 \left(\frac{9}{4} \right) - 18 \left(\frac{3}{2} \right) + 12 = \frac{27-45+24}{2} = -\frac{3}{2} \\ f \left(\frac{3}{2} \right) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

ولدينا:

بالتعويض نجد: $y = -\frac{3}{2} \left(x - \frac{3}{2} \right) - \frac{1}{2}$ ومنه: $y = -\frac{3}{2}x + \frac{9}{4} - \frac{1}{2}$ إذن: $y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{4}$ $(\Delta):$

5. التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = (x-1)^2(2x-5)$

لدينا: $(x-1)^2(2x-5) = [(x-1)(x-1)](2x-5) = (x^2-x-x+1)(2x-5)$

ومنه: $(x-1)^2(2x-5) = (x^2-2x+1)(2x-5)$

ويكون: $(x-1)^2(2x-5) = 2x^3 - 5x^2 - 4x^2 + 10x + 2x - 5$

إذن: $(x-1)^2(2x-5) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 5 = f(x)$ (وهو المطلوب).

استنتاج نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل: (نحل المعادلة $f(x) = 0$)


لدينا: $f(x) = 0$ معناه: $(x-1)^2(2x-5) = 0$

ومنه: $(x-1)^2 = 0$ أو $2x-5 = 0$

وعليه: $x-1 = 0$ أو $2x-5 = 0$

ويكون: $x = 1$ أو $x = \frac{5}{2}$ ، إذن: $(C_f) \cap (xx') = \left\{ A(1; 0); B \left(\frac{5}{2}; 0 \right) \right\}$

6. رسم (Δ) و (C_f) :



حل التمرين 04: (06 نقاط) بكالوريا 2010 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

اختيار الإجابة الصحيحة، مع التعليل:

1. 2. الحساب.

3. لدينا: $D_g = \mathbb{R}$ و $g(x) = x^3 + 3x + 4$ و (C_g) التمثيل البياني لـ g في مستو منسوب إلى معلم.

(1) الدالة g : أ) متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

لأن: g قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ، ولدينا: $g'(x) = 3x^2 + 3 > 0$

ومنه: g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ ، إذن: الإجابة الصحيحة هي: أ).

(2) (C_g) يقبل نقطة انعطاف إحداثياتها: ب) $(0; 4)$ ، لأن:

لدينا: $g''(x) = 6x$.

إشارة $f''(x)$:

نضع: $g''(x) = 0$ نجد: $6x = 0$ ومنه: $x = 0$.

وبالتالي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g''(x)$		$\bigcirc$	
	-		+

نلاحظ أن $g''(x)$ تنعدم عند 0، وتُغيّر إشارتها إذن: النقطة $I(0; g(0))$ أي: $I(0; 4)$ نقطة انعطاف لـ (C_g) .

حل التمرين 05: (07 نقاط) بكالوريا 2010 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

f دالة عددية معرفة على المجال $[-2; 2]$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد متجانس.

من البيان:

1. أ- تعيين $f'(1)$ و $f'(-1)$:

نلاحظ من الشكل أن (C_f) يقبل في النقطتين اللتين فاصلتهما 1 و (-1) مماسين يُوازيان محور الفواصل،

إذن: $f'(1) = 0$ و $f'(-1) = 0$.

ب- تعيين صورتى العددين (-2) و (-1) بواسطة الدالة f :

من الشكل نجد: $f(-2) = 0$ و $f(-1) = -4$.

ج- تشكيل جدول تغيّرات الدالة f على المجال $[-2; 2]$:

x	-2	-1	1	2
$f'(x)$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
$f(x)$	0	-4	0	-4

2. باستعمال اتجاه تغيّر الدالة f ، مقارنة العددين $f\left(\frac{3}{2}\right)$ و $f(\sqrt{3})$:

العددين $\frac{3}{2}$ و $\sqrt{3}$ ينتميان إلى المجال $[1; 2]$ ، والدالة f متناقصة تماما على هذا المجال $[1; 2]$ ؛


وبما أن $\frac{3}{2} < \sqrt{3}$ فإن: $f\left(\frac{3}{2}\right) > f(\sqrt{3})$.

3. لدينا: A هي النقطة من المنحنى (C_f) التي إحداثياتها $(0; -2)$ ، وبفرض أن $f'(0) = 3$ ؛

شرح كيف يُمكن رسم مماس المنحنى (C_f) في النقطة A ثم رسمه:

لإنشاء هذا المماس؛ نتبع ما يلي:

- نُنشئ نقطة B بحيث المستقيم (AB) يُوازي محور الفواصل، وتكون B على يمين A ويكون $AB = 1$.
- نُنشئ نقطة C بحيث المستقيم (BC) يُوازي محور الترتيب، وتكون C أعلى من B (لأنّ $f'(0) = 3 > 0$ ويكون $BC = 3$).



حل التمرين 06: (08 نقاط) بكالوريا 2011 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

(أ) لدينا: $g(x) = -x^2 + 2x + 3$ و $D_g = \mathbb{R}$. (ملاحظة: g دالة كثير حدود من الدرجة الثانية)

بقراءة بيانية:

1. تشكّل جدول تغيّرات الدالة g على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	○	-
$g(x)$	$-\infty$	4	$-\infty$

2. تعيين حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$g(x)$	-	○	+	-

(ب) لدينا: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 3$ و $D_f = \mathbb{R}$.

1. تبيان أنّ، $f'(x) = -g(x)$ ثم استنتاج إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$:

$f'(x) = \frac{1}{3}(3)x^2 - 2x - 3 = x^2 - 2x - 3$ ولدينا: $\mathbb{R}$ ؛ وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$

ومنّه: $f'(x) = -(-x^2 + 2x + 3) = -g(x)$

(لأنّ $g(x) = -x^2 + 2x + 3$)

استنتاج إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$g(x)$	-	$\bigcirc$	+	$\bigcirc$	-
$f'(x)$	+	$\bigcirc$	-	$\bigcirc$	+

2. حساب نهاية الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{3}x^3\right) = -\infty \quad \blacksquare$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}x^3\right) = +\infty \quad \blacksquare$$

3. حساب $f(-1)$ ، $f(3)$ ثم تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

بالتعويض نجد:

$$f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + 3 = \frac{1}{3}(-1) - (1) + 3 + 3 = -\frac{1}{3} + 5 \quad \blacksquare$$

$$\text{ومنه: } f(-1) = \frac{-1+15}{3} = \frac{14}{3}$$

$$f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 - (3)^2 - 3(3) + 3 = (3)^2 - 9 - 9 + 3 = -9 + 3 = -6 \quad \blacksquare$$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	$\bigcirc$	$-$	$\bigcirc$	$+$
$f(x)$		$\frac{14}{3}$			$+\infty$

$-\infty$

$\nearrow$

$\searrow$

-6

$\nearrow$

$+\infty$

4. تبين أنه يوجد مماسان للمنحنى (C_f) معامل توجيه كل منهما يساوي 5:

$$\text{نضع: } f'(x) = 5 \text{ أي: } x^2 - 2x - 3 = 5$$

$$\text{ومنه: } x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(-8) = 4 + 32 = 36 > 0 \quad \text{مميزها:}$$

للمعادلة حلين متميزين هما:

$$x'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) - \sqrt{36}}{2(1)} = \frac{2-6}{2} = -2 \quad \text{و} \quad x' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) + \sqrt{36}}{2(1)} = \frac{2+6}{2} = 4$$

$$(f'(-2) = f'(4) = 5 \text{ أي:})$$

إذن: يوجد مماسان للمنحنى (C_f) معامل توجيه كل منهما يساوي 5.

5. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة، $f(x) = g(x)$ ثم استنتاج احداثيات نقط تقاطع المنحنيين (C_f) و (C_g) :

$$\text{لدينا: } f(x) = g(x) \text{ معناه: } \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 3 = -x^2 + 2x + 3$$

$$\text{ومنه: } \frac{1}{3}x^3 - 3x = 2x$$

$$\text{وعليه: } \frac{1}{3}x^3 - 5x = 0$$

$$\text{ويكون: } x\left(\frac{1}{3}x^2 - 5\right) = 0$$

$$\text{وعليه: } \frac{1}{3}x^2 - 5 = 0 \text{ أو } x = 0$$

$$\text{أي: } x^2 - 15 = 0 \text{ أو } x = 0$$

ويكون: $x = 0$ أو $x^2 = 15$

وبالتالي: $x = 0$ أو $x = \sqrt{15}$ أو $x = -\sqrt{15}$ ؛ إذن: $S = \{-\sqrt{15}; 0; \sqrt{15}\}$.

استنتاج احداثيات نقط تقاطع المنحنيين (C_g) و (C_f) :

بمأن: للمعادلة $f(x) = g(x)$ ثلاث حلول في $\mathbb{R}$ ، فإن: المنحنيين (C_g) و (C_f) يتقاطعان في ثلاث نقاط إحداثيها هي: $(\sqrt{15}; -12 + 2\sqrt{15})$ ؛ $(0; 3)$ و $(-\sqrt{15}; -12 - 2\sqrt{15})$.

حل التمرين 07: (08 نقاط) بكالوريا 2012 // الموضوع 01 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$ و $D_f = \mathbb{R}$.

1. حساب نهاية الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$:

■ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) = +\infty$

■ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3) = -\infty$

2. حساب $f'(x)$ ثم دراسة إشارتها:

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ؛ ولدينا: $f'(x) = -3x^2 + 6x$.

دراسة إشارة $f'(x)$:

نضع: $f'(x) = 0$ نجد: $-3x^2 + 6x = 0$ ومنه: $-3x(x - 2) = 0$ وعليه: $x = 0$ أو $x = 2$.
وبالتالي:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-		+	 -

3. تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	-	○	+	○	-
$f(x)$	$+\infty$			0	
	-4				$-\infty$

حيث: $f(0) = -4$ و $f(2) = -(2)^3 + 3(2)^2 - 4 = -8 + 3(4) - 4 = 0$.

4. كتابة معادلة للمستقيم (Δ) المماس للمنحنى (C) في النقطة ذات الفاصلة 1:

معادلته (Δ) من الشكل: $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

ولدينا: $\begin{cases} f'(1) = -3(1)^2 + 6(1) = -3 + 6 = 3 \\ f(1) = -(1)^3 + 3(1)^2 - 4 = -1 + 3 - 4 = -2 \end{cases}$

بالتعويض نجد: $y = 3(x - 1) - 2$ ومنه: $y = 3x - 3 - 2$ ؛ إذن: $(\Delta): y = 3x - 5$.

ب) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) - (3x - 5) = -(x - 1)^3$:

• لدينا: $f(x) - (3x - 5) = -x^3 + 3x^2 - 3x + 1$

ومنه: $f(x) - (3x - 5) = -x^3 + 3x^2 - 3x + 1$ (1)

• ولدينا من جهة أخرى: $-(x - 1)^3 = -[(x - 1)(x - 1)(x - 1)]$

ومنه: $-(x - 1)^3 = -[(x^2 - x - x + 1)(x - 1)] = -[(x^2 - 2x + 1)(x - 1)]$

وعليه: $-(x - 1)^3 = -(x^3 - x^2 - 2x^2 + 2x + x - 1) = -(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)$

وبالتالي: $(2) \boxed{-(x-1)^3 = -x^3 + 3x^2 - 3x + 1}$

من (1) و (2) نجد: $f(x) - (3x - 5) = -(x - 1)^3$ (وهو المطلوب).

ج) دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C) والمستقيم (Δ) : (ندرس إشارة الفرق $f(x) - y$)

لدينا: $f(x) - y = f(x) - (3x - 5) = -(x - 1)^3$

إشارة الفرق $f(x) - y$ من إشارة $-(x - 1)$.


وبالتالي:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x - 1$	-	○	+
$-(x - 1)$	+	○	-
$f(x) - y$	+	○	-
الوضع النسبي	(C_f) يقع فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ)	(C_f) يقع تحت (Δ)

5. حساب $f(-1)$ ثم إنشاء المماس (Δ) والمنحنى (C) :

لدينا: $f(-1) = -(-1)^3 + 3(-1)^2 - 4 = -(-1) + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$

إنشاء المماس (Δ) والمنحنى (C) :



حل التمرين 08: (08 نقاط) بكالوريا 2013 // الموضوع 01 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: المنحنى (C) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$ والمستقيم (Δ) هو مماس للمنحنى (C) عند مبدأ المعلم O ، حيث: $y = g(x)$ معادلة له.

(ملاحظة: معامل توجيه (Δ) هو $f'(0)$ ، ومعادلته من الشكل: $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$)

أي: $y = g(x) = f'(0)(x - 0) + f(0)$

(I) بقراءة بيانية، تعيين:

1- عدد نقط تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل:

من البيان: المنحنى (C) يتقاطع مع حامل محور الفواصل في نقطتين.

2- إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$: من البيان: إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$ هي كالتالي،

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f(x)$	-	○	○	+

3- عدد حلول المعادلة، $f(x) = g(x)$:

من البيان: عدد حلول المعادلة، $f(x) = g(x)$ هو حلان.

(II) باستعمال عبارة الدالة f :

لدينا: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$ و $D_f = \mathbb{R}$.

1-أ) حساب نهاية الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty \quad \blacksquare$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3) = +\infty \quad \blacksquare$$

ب) حساب $f'(x)$ ، ثم دراسة إشارتها:

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ؛ ولدينا: $f'(x) = 3x^2 - 8x + 4$.

دراسة إشارة $f'(x)$:

نضع: $f'(x) = 0$ نجد: $3x^2 - 8x + 4 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4(3)(4) = 64 - 48 = 16 > 0 \quad \text{مميزها:}$$

للمعادلة حلين متميزين هما:

$$x' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-8) + \sqrt{16}}{2(3)} = \frac{8 + 4}{6} = 2 \quad \text{و} \quad x'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-8) - \sqrt{16}}{2(3)} = \frac{8 - 4}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

وبالتالي:

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+

ج) تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{32}{27}$	0	$+\infty$

حيث: $f(2) = (2)^3 - 4(2)^2 + 4(2) = 8 - 16 + 8 = 0$

$$\text{و} \quad f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 - 4\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 4\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{27} - 4\left(\frac{4}{9}\right) + \frac{8}{3} = \frac{8 - 16(3) + 8(9)}{27} = \frac{32}{27}$$

2-أ) إثبات أنه، من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = x(x - 2)^2$:

لدينا: $x(x - 2)^2 = x[(x - 2)(x - 2)] = x(x^2 - 2x - 2x + 4)$

ومنه: $x(x - 2)^2 = x^3 - 4x^2 + 4x = f(x)$ (وهو المطلوب)

(ب) تعيين إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل: (نحل المعادلة $f(x) = 0$)

لدينا: $f(x) = 0$ معناه: $x(x - 2)^2 = 0$

ومنه: $x = 0$ أو $(x - 2)^2 = 0$

وعليه: $x = 0$ أو $x - 2 = 0$

ويكون: $x = 0$ أو $x = 2$ ، إذن: $(C_f) \cap (xx') = \{O(0; 0); A(2; 0)\}$.

3-أ) تبيان أن، $g(x) = 4x$:

لدينا: المستقيم (Δ) هو مماس للمنحنى (C) عند مبدأ المعلم O ، حيث: $y = g(x)$ معادلة له.

معناه: معامل توجيه (Δ) هو $f'(0)$ ، ومعادلته من الشكل: $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

أي: $y = g(x) = f'(0)(x - 0) + f(0)$

ولدينا: $\begin{cases} f'(0) = 3(0)^2 - 8(0) + 4 = 4 \\ f(0) = (0)^3 - 4(0)^2 + 4(0) = 0 \end{cases}$ ، بالتعويض نجد: $(\Delta): y = g(x) = 4x$.

(ب) تعيين فواصل نقط تقاطع (C) مع (Δ) : (نحل المعادلة $f(x) = y$)

لدينا: $f(x) = y$ معناه: $f(x) = g(x)$

أي: $x^3 - 4x^2 + 4x = 4x$

ومنه: $x^3 - 4x^2 = 0$

وعليه: $x^2(x - 4) = 0$

ويكون: $x^2 = 0$ أو $x - 4 = 0$

إذن: $x = 0$ أو $x = 4$.

4-تبيان أن، (C) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها $\frac{4}{3}$:

لدينا: $f''(x) = 6x - 8$

إشارة $f''(x)$:

نضع: $f''(x) = 0$ نجد: $6x - 8 = 0$ ومنه: $x = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$.

وبالتالي:

x	$-\infty$	$\frac{4}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	$\bigcirc$	+

نلاحظ أن $f''(x)$ تنعدم عند $\frac{4}{3}$ ، وتُغيّر إشارتها إذن: النقطة $I\left(\frac{4}{3}; f\left(\frac{4}{3}\right)\right)$ نقطة انعطاف لـ (C).

5-تعيين بيانيا، مجموعة قيم الوسيط الحقيقي m ، التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = m$ ثلاثة حلول متميزة:

المعادلة $f(x) = m$ تقبل ثلاثة حلول متميزة معناه: المنحنى (C) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y = m$ (الموازي

لمحور الفواصل) في ثلاث نقط، من البيان نجد: $0 < m < \frac{32}{27}$ أي: $m \in]0; \frac{32}{27}[$.

حل التمرين 09: (08 نقاط) بكالوريا 2014 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني (C_f) ، و (T) مماس للمنحنى (C_f) عند النقطة $A(1; 3)$

(أي: معامل توجيهه هو $f'(1)$ ، ومعادلته من الشكل $y = f'(1)(x - 1) + \underbrace{f(1)}_3$)

(I) بقراءة بيانية:

(1) تخمين نهايتي الدّالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$:

من البيان نُخمن أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

(2) دراسة اتجاه تغيّر الدّالة f على $\mathbb{R}$ وتشكيل جدول تغيّراتها:

من البيان:

f متزايدة تماماً على كل من المجالين $]-\infty; 0]$ و $[2; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على المجال $[0; 2]$.
تشكيل جدول تغيّرات f :

من البيان:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+
$f(x)$	$-\infty$	5	1	$+\infty$

(3) كتابة معادلة للمماس (T) :

من المعطيات لدينا: (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة $A(1; 3)$

معناه: معامل توجيهه هو $f'(1)$ ، حيث $f'(1) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 3}{2 - 1} = \frac{-3}{1} = -3$ ، و $f'(1) = -3$ ، و $A(1; 3) \in (T)$ و $B(2; 0) \in (T)$

ومعادلته من الشكل $y = f'(1)(x - 1) + \underbrace{f(1)}_3$

بالتعويض نجد: $y = -3(x - 1) + 3$ ومنه: $y = -3x + 3 + 3$ إذن: $(T): y = -3x + 6$

(ب) دراسة وضعية (C_f) بالنسبة للمماس (T) :

من البيان:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	-	○	+
الوضع النسبي	(C_f) يقع تحت (T)	(C_f) يقطع (T)	(C_f) يقع فوق (T)

استنتاج أن A هي نقطة الانعطاف للمنحنى (C_f) :

بما أن (T) يخترق (C_f) في النقطة A فهي نقطة انعطاف لـ (C_f) .

(4) تعيين حلول المتراجحة $f(x) > 5$:

حلول المتراجحة $f(x) > 5$ بيانياً هي فواصل نقط المنحنى (C_f) الواقعة فوق المستقيم ذو المعادلة $y = 5$ ، باستثناء فواصل نقط التقاطع.

من البيان نجد: $S =]3; +\infty[$

(II) علماً أن f معرفة على $\mathbb{R}$ بالشكل: $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ حيث a و b عدنان حقيقيان.

(1) تعيين العددين a و b :

لدينا: $f(0) = 5 = b$ ومنه: $f(x) = x^3 + ax^2 + 5$

ولدينا: $f(1) = 3$ لأن: $A(1; 3) \in (C_f)$ ومنه: $1 + a + 5 = 3$ وبالتالي: $a = -3$

إذن: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$

(2) التحقق من صحة إجاباتي السابقة حول:

(أ) اتجاه تغير الدالة f :

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ؛ ولدينا: $f'(x) = 3x^2 - 6x$

دراسة إشارة $f'(x)$:

نضع: $f'(x) = 0$ نجد: $3x^2 - 6x = 0$ ومنه: $3x(x - 2) = 0$ وعليه: $x = 0$ أو $x = 2$. وبالتالي:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	○	○	-

إذن: f متزايدة تماماً على كل من المجالين $]-\infty; 0]$ و $[2; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على المجال $[0; 2]$.
(ب) معادلة المماس (T) :

(T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة $A(1; 3)$ ، معادلته من الشكل: $y = f'(1)(x - 1) + \underbrace{f(1)}_3$

ولدينا: $\begin{cases} f'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = 3 - 6 = -3 \\ f(1) = 3 \end{cases}$

بالتعويض نجد: $y = -3(x - 1) + 3$ ومنه: $y = -3x + 3 + 3$ إذن: $(T): y = -3x + 6$

(ج) نقطة الانعطاف A :

لدينا: $f''(x) = 6x - 6$

إشارة $f''(x)$:

نضع: $f''(x) = 0$ نجد: $6x - 6 = 0$ ومنه: $x = \frac{6}{6} = 1$

وبالتالي:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	-	○	+

نلاحظ أنّ $f''(x)$ تتعدم عند 1، وتُغيّر إشارتها إذن: النقطة $A(1; f(1))$ أي: $A(1; 3)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .

(د) حلول المتراجحة، $f(x) > 5$:

$f(x) > 5$ معناها: $x^3 - 3x^2 + 5 > 5$ أي: $x^3 - 3x^2 > 0$ ومنه: $x^2(x - 3) > 0$

ندرس إشارة $x^2(x - 3)$

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
x	-	○	+	
x^2	+	○	+	
$x - 3$		-	○	+
$x^2(x - 3)$	-	○	○	⊕

إذن: $S =]3; +\infty[$

حل التمرين 10: (08 نقاط) بكالوريا 2015 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: $f(x) = x^3 - 3x + 2$ و $D_f = \mathbb{R}$.

(1) حساب نهاية الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3) = +\infty$$

(2) دراسة اتجاه تغيّر الدالة f ؛ ثم تشكيل جدول تغيّراتها:

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ؛ ولدينا: $f'(x) = 3x^2 - 3$.

إشارة $f'(x)$:

$$\text{نضع: } f'(x) = 0 \text{ نجد: } 3x^2 - 3 = 0$$

$$\text{ومنه: } x^2 = 1$$

$$\text{وعليه: } x = \sqrt{1} = 1 \text{ أو } x = -\sqrt{1} = -1$$

وبالتالي:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+

إذن: f متزايدة تماماً على كل من المجالين $[-\infty; -1]$ و $[1; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على المجال $[-1; 1]$.
ويكون جدول تغيّراتها كالتالي:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+
$f(x)$	$-\infty$	4	0	$+\infty$

حيث: $f(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$

و $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = 4$

(3) تبين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثيها:

لدينا: $f''(x) = 6x$.

إشارة $f''(x)$:

$$\text{نضع: } f''(x) = 0 \text{ نجد: } 6x = 0 \text{ ومنه: } x = 0$$

وبالتالي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	○	+

نلاحظ أن $f''(x)$ تنعدم عند 0، وتغيّر إشارتها إذن: النقطة $I(0; f(0))$ أي: $I(0; 2)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .

(4) كتابة معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0:

معادلة (T) من الشكل: $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$


$$\text{ولدينا: } \begin{cases} f'(0) = 3(0)^2 - 3 = -3 \\ f(0) = 2 \end{cases} \text{ بالتعويض نجد: } (T): y = -3x + 2$$

(5) حساب $f(-2)$ و $f(2)$ ؛ ثم إنشاء (T) و (C_f) ؛ بالتعويض نجد:

$$f(-2) = (-2)^3 - 3(-2) + 2 = -8 + 6 + 2 = 0$$

$$f(2) = (2)^3 - 3(2) + 2 = 8 - 6 + 2 = 4$$

إنشاء (T) و (C_f) :



(6) (أ) إنشاء المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 2$:

(ب) حل، في $\mathbb{R}$ ، بياناً المتراجحة $f(x) \geq x + 2$:

حلول المتراجحة $f(x) \geq x + 2$ بياناً هي فواصل نقط المنحنى (C_f) الواقعة فوق المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 2$ ، مع فواصل نقط التقاطع.

من البيان نجد: $S = [-2; 0] \cup [2; +\infty[$.

حل التمرين 11: (08 نقاط) بكالوريا 2016 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: $D_f = \mathbb{R}$ و $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

(1) حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3) = +\infty$$

(2) (أ) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = (3x - 3)(x - 3)$:

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ؛ ولدينا: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$.

$$(3x - 3)(x - 3) = 3x^2 - 9x - 3x + 9 = 3x^2 - 12x + 9$$

إذن: $f'(x) = (3x - 3)(x - 3)$.

(ب) دراسة اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها:

إشارة $f'(x)$:

نضع: $f'(x) = 0$ أي: $(3x - 3)(x - 3) = 0$

ومنه: $x - 3 = 0$ أو $3x - 3 = 0$

وعليه: $x = 3$ أو $x = 1$

وبالتالي:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+

إذن: f متزايدة تماماً على كل من المجالين $]-\infty; 1[$ و $]3; +\infty[$ و متناقصة تماماً على المجال $[1; 3]$.

ويكون جدول تغيراتها كالتالي:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	○	+
$f(x)$	$-\infty$	4	0	$+\infty$

حيث: $f(1) = 4$ و $f(3) = 0$

(3أ) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة E ذات الفاصلة 2:

معادلة (T) من الشكل: $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$

$f'(2) = (3(2) - 3)(2 - 3) = (3)(-1) = -3$

ولدينا: $f(2) = (2)^3 - 6(2)^2 + 9(2) = 8 - 6(4) + 18 = 8 - 24 + 18 = 2$

بالتعويض نجد: $y = -3(x - 2) + 2$ ومنه: $y = -3x + 6 + 2$ إذن: $(T): y = -3x + 8$

(ب) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x , $f(x) - (-3x + 8) = (x - 2)^3$:

لدينا: $f(x) - (-3x + 8) = x^3 - 6x^2 + 9x + 3x - 8 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

ولدينا من جهة أخرى: $(x - 2)^3 = (x - 2)(x - 2)^2 = (x - 2)[(x - 2)(x - 2)]$

ومنه: $(x - 2)^3 = (x - 2)(x^2 - 2x - 2x + 4) = (x - 2)(x^2 - 4x + 4)$

وعليه: $(x - 2)^3 = x^3 - 4x^2 + 4x - 2x^2 + 8x - 8 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

إذن: $f(x) - (-3x + 8) = (x - 2)^3$

(ج) استنتاج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة الى المماس (T) : (ندرس إشارة الفرق $f(x) - y$)

لدينا: $f(x) - y = f(x) - (-3x + 8) = (x - 2)^3$

إشارة الفرق $f(x) - y$ من إشارة $(x - 2)$.

وبالتالي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x - 2$	-	○	+
$f(x) - y$	-	○	+
الوضع النسبي	(C_f) يقع تحت (T)	(C_f) يقطع (T)	(C_f) يقع فوق (T)

(د) تبرير أنّ E نقطة انعطاف للمنحنى (C_f) :

لدينا: $f''(x) = 6x - 12$

إشارة $f''(x)$:

نضع: $f''(x) = 0$ نجد: $6x - 12 = 0$ ومنه: $x = \frac{12}{6} = 2$

وبالتالي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	$\bigcirc$	$+$

نلاحظ أنّ $f''(x)$ تنعدم عند 2، وتغيّر إشارتها إذن: النقطة ذات الإحداثيي $(2; f(2))$ وهي النقطة: $E(2; 2)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .

(4) ا) تبيان أنّه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = x(x - 3)^2$:

لدينا: $x(x - 3)^2 = x[(x - 3)(x - 3)] = x(x^2 - 3x - 3x + 9) = x(x^2 - 6x + 9)$
ومنّه: $x(x - 3)^2 = x^3 - 6x^2 + 9x = f(x)$ (وهو المطلوب).

(ب) إيجاد إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل حور الفواصل: (نحل المعادلة $f(x) = 0$)

لدينا: $f(x) = 0$ معناه: $x(x - 3)^2 = 0$

ومنّه: $x = 0$ أو $(x - 3)^2 = 0$


وعليه: $x = 0$ أو $x - 3 = 0$

ويكون: $x = 0$ أو $x = 3$ ، إذن: $(C_f) \cap (xx') = \{O(0; 0); A(3; 0)\}$

(5) حساب $f(4)$ ثم إنشاء المماس (T) والمنحنى (C_f) :

بالتعويض نجد:

▪ $f(4) = (4)^3 - 6(4)^2 + 9(4) = 64 - 96 + 36 = 4$



حل التمرين 12: (08 نقاط) بكالوريا 2017_01 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ

لدينا: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$ و $D_f = \mathbb{R}$

(1) حساب النهايتين، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{3}x^3 \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}x^3 \right) = +\infty$$

(2) ا) تبيان أن: من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = (x-2)(x+2)$:

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ؛ ولدينا:

$$f'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 4 = x^2 - 4 = x^2 - (2)^2 = (x-2)(x+2)$$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

إشارة $f'(x)$:

$$\text{نضع: } f'(x) = 0 \text{ أي: } (x-2)(x+2) = 0$$

$$\text{ومنه: } x-2 = 0 \text{ أو } x+2 = 0$$

$$\text{وعليه: } \boxed{x = -2} \text{ أو } \boxed{x = 2}$$

وبالتالي:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\circ$	$-$	$+$

إذن: f متزايدة تماماً على كل من المجالين $[-\infty; -2]$ و $[2; +\infty]$ ، و متناقصة تماماً على المجال $[-2; 2]$.
(3) تشكيل جدول تغيّرات الدالة f :

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\circ$	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{16}{3}$	$-\frac{16}{3}$	$+\infty$

حيث: $f(-2) = \frac{1}{3}(-2)^3 - 4(-2) = \frac{-8}{3} + 8 = \frac{-8+24}{3} = \frac{16}{3}$

و $f(2) = \frac{1}{3}(2)^3 - 4(2) = \frac{8}{3} - 8 = \frac{8-24}{3} = -\frac{16}{3}$

(4) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$:

$f(x) = 0$ معناه: $\frac{1}{3}x^3 - 4x = 0$

ومنه: $x\left(\frac{1}{3}x^2 - 4\right) = 0$

وعليه: $x = 0$ أو $\frac{1}{3}x^2 - 4 = 0$ (بضرب الطرفين في العدد 3)

ويكون: $x = 0$ أو $x^2 = 12$

وبالتالي: $x = 0$ أو $x = \sqrt{12}$ أو $x = -\sqrt{12}$

إذن: $S = \{-2\sqrt{3}; 0; 2\sqrt{3}\}$

استنتاج إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامل محوري الإحداثيات:

■ تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الترتيب: (نحسب $f(0)$)

لدينا: $f(0) = 0$ (حسب نتيجة السؤال السابق 0 حل للمعادلة $f(x) = 0$)

إذن: $(C_f) \cap (yy') = \{O(0; 0)\}$

■ تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل: (نحل المعادلة $f(x) = 0$)

لدينا: $f(x) = 0$ حلولها: $x = 0$ أو $x = 2\sqrt{3}$ أو $x = -2\sqrt{3}$ (حسب نتيجة السؤال السابق)

إذن: $(C_f) \cap (xx') = \{A(-2\sqrt{3}; 0); O(0; 0); B(2\sqrt{3}; 0)\}$

(5) تبين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف هي مبدأ المعلم:

لدينا: $f''(x) = 2x$

إشارة $f''(x)$:

نضع: $f''(x) = 0$ نجد: $2x = 0$ ومنه: $x = 0$

وبالتالي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	$\circ$	$+$


نلاحظ أنّ $f''(x)$ تنعدم عند 0، وتُغيّر إشارتها إذن: النقطة ذات الإحداثي $(0; f(0))$ وهي النقطة: $O(0; 0)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .

(6) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0:

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0): \text{الشكل:}$$

$$\text{ولدينا: } \begin{cases} f'(0) = (0)^2 - 4 = -4 \\ f(0) = 0 \end{cases} \text{ بالتعويض نجد: } (\Delta): y = -4x$$

(6) رسم (T) والمنحنى (C_f) :



حل التمرين 13: (08 نقاط) بكالوريا 2017_د02 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: $D_f = \mathbb{R}$ و $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 4$.

(1) حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3) = -\infty$$

(2) التحقق أنّ، من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = (-x + 1)(x + 2)^2$:

$$\text{لدينا: } (-x + 1)(x + 2)^2 = (-x + 1)[(x + 2)(x + 2)]$$

$$\text{ومنه: } (-x + 1)(x + 2)^2 = (-x + 1)(x^2 + 2x + 2x + 4) = (-x + 1)(x^2 + 4x + 4)$$

مجلة العبقرى في الرياضيات (الدّوال كثيرات الحدود -كالوريات جزائرية) الحلول _ الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

وعليه: $(-x + 1)(x + 2)^2 = -x^3 - 4x^2 - 4x + x^2 + 4x + 4 = -x^3 - 3x^2 + 4 = f(x)$

إذن: $f(x) = (-x + 1)(x + 2)^2$

إيجاد إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامل محوري الإحداثيات:

■ تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الترتيب: (نحسب $f(0)$)

لدينا: $f(0) = -(0)^3 - 3(0)^2 + 4 = 4$ إذن: $(C_f) \cap (yy') = \{A(0; 4)\}$

■ تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل: (نحل المعادلة $f(x) = 0$)

لدينا: $f(x) = 0$ معناه: $(-x + 1)(x + 2)^2 = 0$

ومنه: $(-x + 1) = 0$ أو $(x + 2)^2 = 0$

وعليه: $-x = -1$ أو $x + 2 = 0$

وبالتالي: $x = 1$ أو $x = -2$ إذن: $(C_f) \cap (xx') = \{B(-2; 0); C(1; 0)\}$

3) دراسة اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها:

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ؛ ولدينا: $f'(x) = -3x^2 - 6x$

إشارة $f'(x)$:

نضع: $f'(x) = 0$ أي: $-3x^2 - 6x = 0$

ومنه: $-3x(x + 2) = 0$

ومنه: $x = 0$ أو $x + 2 = 0$


وعليه: $x = 0$ أو $x = -2$

وبالتالي:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	-	$\bigcirc$	+	$\bigcirc$	-

إذن: f متناقصة تماما على كل من المجالين $[-\infty; -2]$ و $[0; +\infty]$ ، و متزايدة تماما على المجال $[-2; 0]$.

ويكون جدول تغيراتها كالتالي:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$			
$f'(x)$	-		+		-		
$f(x)$	$+\infty$		0		4		$-\infty$

حيث: $f(-2) = 0$ و $f(0) = 4$

4) تبين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف E إحداثياتها $(-1; 2)$:

لدينا: $f''(x) = -6x - 6$

إشارة $f''(x)$:

نضع: $f''(x) = 0$ نجد: $-6x - 6 = 0$ ومنه: $x = \frac{6}{-6} = -1$

وبالتالي:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f''(x)$	+	○	-

مجلة العبقري في الرياضيات (الدّوال كثيرات الحدود - بكالوريا جزائرية) الحلول - الشعبة: آداب وفلسفة؛ لغات أ.

نلاحظ أنّ $f''(x)$ تنعدم عند (-1) ، وتُغيّر إشارتها إذن: النقطة $E(-1; 2)$ أي: $E(-1; 2)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .


(5) كتابة معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة E :

(Δ) مماس للمنحنى (C_f) في النقطة $E(-1; 2)$ ، معادلته من الشكل: $y = f'(-1)(x - (-1)) + \underbrace{f(-1)}_2$

$$\begin{cases} f'(-1) = -3(-1)^2 - 6(-1) = -3(1) + 6 = +3 \\ f(-1) = 2 \end{cases} \text{ولدينا:}$$

بالتعويض نجد: $y = 3(x + 1) + 2$ ومنه: $y = 3x + 3 + 2$ إذن: $(\Delta): y = 3x + 5$

(6) رسم (Δ) و (C_f) :



حل التمرين 14: (08 نقاط) بكالوريا 2018 // الموضوع 01 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: $f(x) = x^3 - 3x^2$ و $D_f = \mathbb{R}$

(1) حساب نهاية الدالة f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3) = +\infty \end{cases} \text{لدينا:}$$

(2) أ) حساب $f'(x)$:

$f'(x) = 3x^2 - 6x$ ولدينا: $f'(x)$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$

دراسة إشارة $f'(x)$:

نضع: $f'(x) = 0$ نجد: $3x^2 - 6x = 0$

ومنه: $3x(x - 2) = 0$

وعليه: $x = 0$ أو $x - 2 = 0$

أي: $x = 0$ أو $x = 2$ ، وبالتالي:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	-	+

(ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها:

f متزايدة تماماً على كل من المجالين $]-\infty; 0]$ و $]2; +\infty[$ ، و متناقصة تماماً على المجال $[0; 2]$.
ويكون جدول تغيراتها كالتالي:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	-	+
$f(x)$	$-\infty$	0	-4	$+\infty$

حيث: $f(0) = 0$ و $f(2) = -4$

(3) تبيان أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتها:

لدينا: $f''(x) = 6x - 6$

إشارة $f''(x)$:

نضع $f''(x) = 0$ نجد: $6x - 6 = 0$ ومنه: $x = \frac{6}{6} = 1$ ، وبالتالي:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	-	○	+

نلاحظ أن $f''(x)$ تنعدم عند 1، وتغير إشارتها، إذن: $I(1; f(1))$ أي: $I(1; -2)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .

(4) كتابة معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1: عند نقطة الانعطاف

معادلة (T) من الشكل: $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

ولدينا:
$$\begin{cases} f'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = 3(1) - 6 = 3 - 6 = -3 \\ f(1) = (1)^3 - 3(1)^2 = 1 - 3(1) = 1 - 3 = -2 \end{cases}$$

بالتعويض نجد: $y = -3(x - 1) - 2$ ، ومنه: $y = -3x + 3 - 2$ إذن: $(T): y = -3x + 1$.

(5) التحقق من أن النقطة O (مبدأ المعلم) والنقطة A ذات الفاصلة 3 هما نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور

الفواصل: (نحل المعادلة $f(x) = 0$)

$f(x) = 0$ معناه: $x^3 - 3x^2 = 0$

ومنه: $x^2(x - 3) = 0$


وعليه: $x^2 = 0$ أو $x - 3 = 0$

ويكون: $x = 0$ أو $x = 3$

وبالتالي: للمعادلة $f(x) = 0$ حلان في $\mathbb{R}$ ،

إذن: المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين هما $O(0; 0)$ و $A(3; 0)$.

(ب) رسم المماس (T) والمنحنى (C_f) :



(6) حل في $\mathbb{R}$ ببيان المتراجحة، $f(x) > 0$:

حلول المتراجحة $f(x) > 0$ ببيان هي فواصل نقط (C_f) الواقعة فوق محور الفواصل بإستثناء فواصل نقط التقاطع.

من البيان نجد: $S =]3; +\infty[$.

(7) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$:

لدينا: $(x + 1)(x - 2)^2 = (x + 1)[(x - 2)(x - 2)] = (x + 1)(x^2 - 2x - 2x + 4) = (x + 1)(x^2 - 4x + 4)$

ومنه: $(x + 1)(x - 2)^2 = (x + 1)(x^2 - 4x + 4) = x^3 - 4x^2 + 4x + x^2 - 4x + 4 = x^3 - 3x^2 + 4 = f(x) + 4$

إذن: $(x + 1)(x - 2)^2 = \underbrace{x^3 - 3x^2 + 4}_{f(x)} = f(x) + 4$ (وهو المطلوب)

حل المعادلة $f(x) = -4$:

المعادلة $f(x) = -4$ تكافئ $f(x) + 4 = 0$

ومنه: $(x + 1)(x - 2)^2 = 0$ (لأنّ $(x + 1)(x - 2)^2 = f(x) + 4$)

وعليه: $x + 1 = 0$ أو $(x - 2)^2 = 0$

ويكون: $x = -1$ أو $x - 2 = 0$

وبالتالي: $x = -1$ أو $x = 2$

إذن: $S = \{-1; 2\}$

حل التمرين 15: (04 نقاط) بكالوريا 2019 // الموضوع 02 // الشعبة: آف؛ لغ أ.

لدينا: $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5$ و $D_f = \mathbb{R}$

(1) احساب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3) = +\infty \end{cases} \text{ لدينا:}$$

(2) احساب $f'(x)$:

f' قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، ولدينا: $f'(x) = 6x^2 + 6x$

دراسة إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$:

نضع: $f'(x) = 0$ نجد: $6x^2 + 6x = 0$

ومنه: $6x(x + 1) = 0$

وعليه: $x = 0$ أو $x + 1 = 0$

أي: $x = 0$ أو $x = -1$ ، وبالتالي:

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	$\bigcirc$	$-$	$\bigcirc$	$+$

(ب) احساب $f(0)$ و $f(-1)$:

لدينا: $f(0) = 2(0)^3 + 3(0)^2 - 5 = -5$

و $f(-1) = 2(-1)^3 + 3(-1)^2 - 5 = 2(-1) + 3(1) - 5 = -2 + 3 - 5 = -4$

تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	$\circ$	$-$	$\circ$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-4	-5	$+\infty$	

(3) أ) التحقق أنه: من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = (x - 1)(2x^2 + 5x + 5)$:

لدينا: $(x - 1)(2x^2 + 5x + 5) = 2x^3 + 5x^2 + 5x - 2x^2 - 5x - 5$

ومنه: $(x - 1)(2x^2 + 5x + 5) = 2x^3 + 3x^2 - 5 = f(x)$

(ب) تعيين نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل: (نحل المعادلة $f(x) = 0$)

$f(x) = 0$ معناه: $(x - 1)(2x^2 + 5x + 5) = 0$ ومنه: $x - 1 = 0$ أو $2x^2 + 5x + 5 = 0$

• $x - 1 = 0$ نجد: $x = 1$

• $2x^2 + 5x + 5 = 0$ مميزها: $\Delta = b^2 - 4ac = (5)^2 - 4(2)(5) = 25 - 40 = -15 < 0$

فهي لا تقبل حولا في $\mathbb{R}$.

وبالتالي: للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في $\mathbb{R}$ وهو $x = 1$

إن: المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة هي $I(1; 0)$.

(4) تبيان أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها $(-\frac{1}{2})$:

لدينا: $f''(x) = 12x + 6$

إشارة $f''(x)$:

نضع $f''(x) = 0$ نجد: $12x + 6 = 0$ ومنه: $x = -\frac{6}{12} = -\frac{1}{2}$ وبالتالي:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	$\bigcirc$	+

نلاحظ أنّ $f''(x)$ تنعدم عند $\left(-\frac{1}{2}\right)$ ، وتُغيّر إشارتها، إذن: $A\left(-\frac{1}{2}; f\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$ أي: $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{9}{2}\right)$ نقطة انعطاف لـ (C_f) .

كتابة معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة A :


معادلة (T) من الشكل: $y = f'\left(-\frac{1}{2}\right)\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) + f\left(-\frac{1}{2}\right)$

$$\begin{cases} f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 6\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 6\left(-\frac{1}{2}\right) = 6\left(\frac{1}{4}\right) - 3 = \frac{3}{2} - 3 = \frac{3-6}{2} = -\frac{3}{2} \\ f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 5 = 2\left(-\frac{1}{8}\right) + 3\left(\frac{1}{4}\right) - 5 = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} - 5 = -\frac{9}{2} \end{cases}$$

ولدينا:

بالتعويض نجد: $y = -\frac{3}{2}\left(x + \frac{1}{2}\right) - \frac{9}{2}$ ، ومنه: $y = -\frac{3}{2}x - \frac{3}{4} - \frac{9}{2}$ إذن: $(T): y = -\frac{3}{2}x - \frac{21}{4}$

5) إنشاء المماس (T) والمنحنى (C_f) :



(6) حل بيانيا المتراجحة، $f(x) \geq 0$:

حلول المتراجحة $f(x) \geq 0$ بيانيا هي فواصل نقط (C_f) الواقعة فوق محور الفواصل مع فواصل نقط التقاطع.

من البيان نجد: $S = [1; +\infty[$.