



المدة: 03 سا ونصف

اختبار البكالوريا التجريبي في مادة الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول:

صندوقان غير شفافين U و V ، يحتوي الصندوق U على أربع كريات حمراء وأربع كريات بيضاء، ويحتوي الصندوق V على كرتين حمراوين وأربع كريات بيضاء (الكرات كلها متماثلة لا نميز بينها عند اللمس) نعتبر التجربة العشوائية التالية: نسحب كرتين في آن من الصندوق U إذا كانتا من نفس اللون نسحب كرتين في آن واحد من الصندوق V ، وإذا كانتا من لونين مختلفين نضعهما في الصندوق V ونسحب منه كرتين في آن واحد. نعتبر الأحداث التالية:

- A : "الكرتان المسحوبتان من الصندوق U من نفس اللون"، B : "الكرتان المسحوبتان من الصندوق V بيضاوان"
 C : "الكرتان المسحوبتان من الصندوق V حمراوان"، D : "الكرتان المسحوبتان من الصندوق V مختلفتي اللون"
(1) احسب $P(A)$.

(2) بين أن: $P_A(B) = \frac{1}{15}$ و $P_A(B) = \frac{3}{28}$ ، ثم استنتج $P(B)$.

(3) علما أن الكرتين المسحوبتين من الصندوق V بيضاوان، ما احتمال أن تكون الكرتان المسحوبتان من الصندوق U من نفس اللون؟

(4) اكمل شجرة الاحتمالات الموضحة في الوثيقة المرافقة.

- (5) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات البيضاء المسحوبة من الصندوق V .
أ) عين قيم المتغير العشوائي X .
ب) عرف قانون احتمال المتغير العشوائي X .

التمرين الثالث:

نعتبر المتتاليتين العدديتين (U_n) و (V_n) المعرفتين على \mathbb{N}^* كما يلي:

$$\begin{cases} V_1 = 12 \\ V_{n+1} = \frac{U_n + 3V_n}{4} \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} U_1 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{U_n + 2V_n}{3} \end{cases}$$

(1) نضع: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $W_n = V_n - U_n$

أ) بين أن المتتالية (W_n) هندسية أساسها $\frac{1}{12}$.

ب) اكتب عبارة الحد العام للمتتالية (W_n) .

ج) احسب: $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n$

- (2) أ) ادرس اتجاه تغير كل من المتتاليتين (U_n) و (V_n) .
ب) استنتج أن المتتاليتين (U_n) و (V_n) متقاربتان نحو نفس النهاية.
3) نعتبر المتتالية (t_n) المعرفة على \mathbb{N}^* كما يلي: $t_n = 3U_n + 8V_n$
أ) بين أن المتتالية (t_n) ثابتة على \mathbb{N}^* .
ب) استنتج النهاية المشتركة للمتتاليتين (U_n) و (V_n) .
4) نعتبر المجموع S_n المعرف على \mathbb{N}^* ب: $S_n = \sum_{k=1}^n C_n^k (V_k - U_k)$. عبر بدلالة n عن المجموع S_n .

التمرين الثالث:

أ. نعتبر الأعداد المركبة z_1, z_2, z_3 بحيث: $z_1 = 2 - 2i, z_2 = \sqrt{6} - i\sqrt{2}$ و $z_3 = \frac{z_2}{z_1}$.

- (1) أ) اكتب كل من z_1, z_2 على شكل أسي.
ب) استنتج شكل أسي للعدد z_3 .
(2) أ) اكتب z_3 على الشكل الجبري، ثم على شكل مثلي.
ب) استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
أ. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ النقط A, B و M لواحقتها z_1, z_2 و z على الترتيب.

ولنعبر العدد المركب L المعرف من أجل كل عدد مركب z يختلف عن z_1 كما يلي: $L = \frac{z - z_2}{z - z_1}$.

- (1) عين (E_1) مجموعة النقط M بحيث: $|L| = 1$.
(2) عين (E_2) مجموعة النقط M بحيث: $L \in \mathbb{R}^*$.
(3) عين (E_1) مجموعة النقط M بحيث: L تخيلي صرف.

التمرين الرابع:

أ. نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R} ب: $g(x) = (x^2 + 2x)e^{x-1} - 1$.

- (1) ادرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.
(2) أ) بين أن: المعادلة: $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث: $0,58 < \alpha < 0,59$.
ب) ادرس إشارة $g(x)$ تبعا لقيم العدد الحقيقي x .
أ. نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} ب: $f(x) = x^2 e^{x-1} - x$.
(C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (وحدة الطول هي: $2cm$)

(1) أ) احسب كلا من: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

ب) بين أن: المستقيم (D) ذا المعادلة المختصرة $y = -x$ مقارب مائل لـ (C) بجوار $-\infty$.

ج) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C) بالنسبة إلى المستقيم (D) .

(2) أ) بين أن: من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = g(x)$.

ب) استنتج أن: f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; \alpha[$ و متزايدة تماما على المجال $]\alpha; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

ج) اثبت أن (C) يقبل مماسين متوازيين أحدهما ينطبق على (D) ، ثم اكتب معادلة ديكارتية للمماس الثاني.

د) بين أن (C) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيين فاصلتي كل منهما.

3) انشئ كلا من المماسين السابقين، احسب $f(0)$ و $f(1)$ ، ثم مثل (C) . (نأخذ: $f(\alpha) \approx -0,36$).

4) ليكن m وسيطا حقيقيا، ناقش بيانها تبعا لقيم m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = -x + m$.

5) نعتبر التكامل I بحيث: $I = \int_{-1}^0 x^2 e^{x-1} dx$.

أ) باستخدام المكاملة بالتجزئة مرتين احسب قيمة I .

ب) فسر هندسيا النتيجة المحصل عليها.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول:

1. نعتبر كثير الحدود $P(z)$ للمتغير المركب z المعرف كما يلي: $p(z) = z^3 + 2z^2 - 16$.

1) احسب $P(2)$ ، ثم استنتج كثير الحدود $Q(z)$ من الدرجة الثانية بحيث يكون:

$$P(z) = (z-2) \cdot Q(z): z \text{ عدد مركب}$$

2) أ) حل في مجموعة المركبة \mathbb{C} المعادلة ذات المجهول z : $P(z) = 0$.

ب) اكتب كل حل من حلول المعادلة السابقة على شكل مثلثي، ثم على شكل أسي.

II. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقط A, B, C, D و

لواحقها z_A, z_B, z_C, z_D على الترتيب بحيث: $z_A = -2 - 2i$ ، $z_B = 2$ ، و $z_D = \overline{z_A}$.

1) علم النقط A, B, D .

2) احسب z_C بحيث يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

3) نعتبر العدد المركب L المعرف بـ: $L = \frac{z_A}{z_D}$.

أ) اكتب العدد L على شكل أسي.

ب) أعط تفسيراً هندسياً لكل من $|L|$ و $\arg(L)$.

ج) استنتج طبيعة المثلث AOD .

التمرين الثاني:

1. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى

المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. كما هو موضح في الشكل المرفق.

1) اثبت أن: الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[1; +\infty[$.

2) بين أن: إذا كان: $x \in [1; 2]$ فإن: $f(x) \in [1; 2]$.

II. نعتبر المتتالية (U_n) المعرفة على \mathbb{N} كما يلي:
$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$

1) أ. مثل على حامل محور الفواصل الحدود الثلاثة الأولى للمتتالية (U_n) مبرزاً خطوط الانشاء.

ب. أعط تخميناً حول رتبة وتقارب المتتالية (U_n) .

(2) أ. برهن أن من أجل كل عدد طبيعي n : $1 < U_n \leq 2$

ب. اثبت أن المتتالية (U_n) متناقصة تماما على \mathbb{N} .

ج. برر تقارب المتتالية (U_n) .

III. نعتبر المتتاليتين العدديتين (V_n) و (W_n) المعرفتين على \mathbb{N} كما يلي: $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n}$ و $W_n = \ln V_n$.

(1) أ) بين أن المتتالية (W_n) هندسية أساسها 2.

ب) اكتب عبارة الحد العام للمتتالية (W_n) ، ثم استنتج عبارة الحد العام للمتتالية (V_n) .

(2) أ) استنتج أن: من أجل كل عدد طبيعي n : $U_n = \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{2^n} \right]^{-1}$.

ب) احسب: $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

(3) نعتبر الجداء P_n المعرف على \mathbb{N} ب: $P_n = V_0 \times V_1 \times \dots \times V_n$.

عبر بدلالة n عن الجداء P_n .

التمرين الثالث:

يحتوي صندوق غير شفاف على أربع كريات بيضاء، ثلاث كريات سوداء وكريتين حمراوين (الكريات كلها متماثلة لا نميز بينها عند اللمس). نسحب عشوائيا في آن واحد ثلاث كريات من هذا الصندوق.

(1) احسب احتمال كل حدث من الأحداث التالية:

A : " سحب كريتين سوداوين وكرية حمراء " ، B : " سحب ثلاث كريات مختلفة اللون "

C : " سحب كرية حمراء على الأقل "

(2) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الألوان التي تحملها الكريات الثلاث المسحوبة.

أ) برر أن: قيم المتغير العشوائي X هي: $\{1; 2; 3\}$

ب) بين أن: $P(X = 2) = \frac{55}{84}$ ، ثم عرف قانون احتمال المتغير العشوائي X ، ثم احسب أماله الرياضياتي $E(X)$.

التمرين الرابع:

I. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب: $g(x) = x^2 - 2\ln(x)$

(1) ادرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) استنتج أن: من أجل كل $x \in]0; +\infty[$: $g(x) > 0$.

II. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب: $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1 + \ln(x)}{x}$

(C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (وحدة الطول هي: $2cm$)

(1) أ) احسب كلا من: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب) بين أن: المستقيم (D) ذا المعادلة المختصرة $y = \frac{x}{2}$ مقارب مائل لـ (C).

ج) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C) بالنسبة إلى المستقيم (D).

(2) أ) بين أن: من أجل كل $x \in]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$.

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

ج) اثبت أن (C) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي المستقيم (D) في النقطة A ذات الفاصلة 1 ، ثم اكتب معادلة له.

(3) أ) بين أن: من أجل كل $x \in]0; +\infty[$: $f''(x) = \frac{2\ln(x) - 1}{x^3}$.

ب) ادرس إشارة $f''(x)$ ، ثم استنتج أن: (C) يقبل نقطة انعطاف وحيدة B يطلب تعيين احداثيتها.

ج) اكتب معادلة ديكارتية لـ (T') مماس (C) في النقطة B .

(4) أ) بين أن: (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α بحيث: $0,34 < \alpha < 0,35$.

ب) انشئ كلا من (D) ، (T) و (T') ، ثم مثل (C) .

(5) ليكن m وسيطا حقيقيا، ناقش بيانيا تبعا لقيم m عدد حلول المعادلة: $f(x) = \frac{1}{2}x + m$

(6) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز تحت المنحنى (C) بين العددين 1 و e .

انتهى الموضوع الثاني



شجرة الاحتمالات

