

## التمرين الأول :

عين الدالة التآلفية  $f$  في كل حالة من الحالات التالية :

$$f(0) = 3 \text{ و } f(1) = -1$$

$$f(-1) = -1 \text{ و } f(1) = 2$$

$$f(2) = \sqrt{2} \text{ و } f(\sqrt{2}) = 2$$

## التمرين الثاني :

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $f(x) = |-2x|$ .

(1)  $(C_f)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(2) أدرس شفعية الدالة  $f$ .

(3) أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$  على كل من المجالين  $[0; +\infty[$  و  $]-\infty; 0]$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(4) أنشئ  $(C_f)$ .

## التمرين الثالث :

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $f(x) = |x + 1| - 2$ .

(1)  $(C_f)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . التمثيل البياني للدالة  $x \mapsto |x|$ .

(2) أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$  على كل من المجالين  $[-1; +\infty[$  و  $]-\infty; -1]$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) عين نقط تقاطع  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل.

(4) أنشئ  $(P)$ . اشرح كيفية إنشاء  $(C_f)$  اعتمادا على  $(P)$  ثم أنشئه.

## التمرين الرابع :

نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $g(x) = x^2 - 2x$ .

(1)  $(C_g)$  المنحنى الممثل للدالة  $g$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . التمثيل البياني للدالة  $x \mapsto x^2$ .

(2) أدرس شفعية الدالة  $g$ .

(3) أ- تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$ :  $g(x) = (x - 1)^2 - 1$ .

(4) أدرس إتجاه تغير الدالة  $g$  على كل من المجالين  $[1; +\infty[$  و  $]-\infty; 1]$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(5) عين نقط تقاطع  $(C_g)$  مع حامل محور الفواصل.

(6) أنشئ  $(H)$ . اشرح كيفية إنشاء  $(C_g)$  اعتمادا على  $(H)$  ثم أنشئه.

## التمرين الخامس :

$ABCD$  مربع حيث:  $AB = 8 \text{ cm}$ ،  $B'$ ،  $D'$  نقطتان من  $[AB]$  و  $[AD]$  على الترتيب حيث:  $AB' = AD' = x$  مع  $0 < x < 8$ . (أنظر الشكل).

نسمي  $f(x)$  مساحة الجزء الملون.


(1) برهن أن  $f(x) = -x^2 + 4x + 32$  تعطى بالعبارة:

(2) عين قيم العدد الحقيقي  $x$  التي من أجلها تكون مساحة الجزء الملون تساوي مساحة الجزء غير الملون.

(3) أ- تحقق أن من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; 8[$  لدينا:  $f(x) = -(x - 2)^2 + 36$ .

ب- أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$  على كل من المجالين  $[0; 2]$  و  $[2; 8]$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(4) استنتج مما سبق قيمة العدد الحقيقي  $x$  حتى تكون مساحة الجزء الملون أكبر ما يمكن. ما هي عندئذ هذه المساحة؟



## التمرين السادس :

نعتبر الدالة  $h$  المعرفة على  $]-\infty; 1[ \cup ]1; +\infty[$  كما يلي:  $h(x) = \frac{2x-1}{x-1}$

$(C_h)$  المنحنى الممثل للدالة  $h$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .  $(\gamma)$  التمثيل البياني للدالة  $x \mapsto \frac{1}{x}$

(1) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x \neq 1$ ،  $h(x) = 2 + \frac{1}{x-1}$

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة  $h$  على كل من المجالين  $]-\infty; 1[$  و  $]1; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) عين نقط تقاطع  $(C_h)$  مع محوري الإحداثيات.

(4) أنشئ  $(\gamma)$ . إشرح كيفية إنشاء  $(C_h)$  اعتماداً على  $(\gamma)$ ، ثم أنشئه.

## التمرين السابع :

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $]-2; +\infty[$  كما يلي:  $f(x) = -1 + \sqrt{x+2}$

$(C_f)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .  $(\Gamma)$  التمثيل البياني للدالة  $x \mapsto \sqrt{x}$

(1) أدرس اتجاه تغير الدالة  $f$  على المجال  $]-2; +\infty[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) عين نقط تقاطع  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل.

(3) أنشئ  $(\Gamma)$ . إشرح كيفية إنشاء  $(C_f)$  اعتماداً على  $(\Gamma)$ ، ثم أنشئه.

## التمرين الثامن :

القيس بالدرجات	$20^\circ$	.....	$140^\circ$	.....
القيس بالراديان	.....	$\frac{3\pi}{5}$	.....	$\frac{5\pi}{12}$

(1) أنقل وأكمل الجدول التالي:

(2) أضع على الدائرة المثلثية النقط  $A$ ،  $B$  و  $C$  التي صورها  $2019\pi$ ،  $\frac{19\pi}{3}$  و  $\frac{31\pi}{4}$  على الترتيب

بـ. أحسب القيم المضبوطة لجيب تمام و جيب القيم السابقة.

## التمرين التاسع :

إذا علمت أن:  $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

(1) عين القيمة المضبوطة لـ:  $\cos \frac{\pi}{12}$ ،  $\tan \frac{\pi}{12}$

(2) استنتج القيم المضبوطة لكل من:  $\sin \frac{11\pi}{12}$ ،  $\cos \frac{13\pi}{12}$ ،  $\sin \frac{61\pi}{12}$  و  $\tan \frac{2017\pi}{12}$

## التمرين العاشر :

بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :

$$\sin^2(x) - \cos^2(x) = 1 - 2\cos^2(x) \quad (1)$$

$$\cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2\sin^2(x) \quad (2)$$

$$\sin^4(x) - \cos^4(x) = \sin^2(x) - \cos^2(x) \quad (3)$$

$$(\cos x + \sin x)^2 - (\cos x - \sin x)^2 = 4\cos x \cdot \sin x \quad (4)$$