

(I) المساويات و العمليات

- a, b, c أعداد ناطقة.
 • إذا كان $a = b$ فإن $a + c = b + c$
 • إذا كان $a = b$ فإن $a - c = b - c$

أمثلة:

- إذا كان $a = -2$ فإن $a + 13 = -2 + 13$ أي $a + 13 = 11$
 و $a - 5 = -2 - 5$ أي $a - 5 = -7$

 a, b, c أعداد ناطقة.

- إذا كان $a = b$ فإن $a \times c = b \times c$
 • إذا كان $a = b$ فإن $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ (مع $c \neq 0$)

أمثلة:

- إذا كان $x = \frac{3}{2}$ فإن $5x = 5 \times \frac{3}{2}$ أي $5x = \frac{15}{2}$
 و $\frac{x}{-5} = \frac{3}{2} \div (-5)$ أي $\frac{x}{-5} = -\frac{3}{10}$ أو $\frac{x}{-5} = \frac{3}{-10}$

تطبيقات: تمارين 1، 2 و 5 صفحة 78.

(II) المتباينات و العمليات

المتباينات و الجمع أو الطرح

- a, b, c أعداد ناطقة.
 • إذا كان $a < b$ فإن $a + c < b + c$
 • إذا كان $a < b$ فإن $a - c < b - c$

أمثلة:

- إذا كان $y < 3$ فإن $y + 4 < 3 + 4$ أي $y + 4 < 7$
 و $y - \frac{1}{2} < 3 - \frac{1}{2}$ أي $y - \frac{1}{2} < \frac{5}{2}$

لا يتغير اتجاه متباينة إذا أضفنا (أو طرحنا من) طرفيها نفس العدد.

يمكن استبدال الرمز < بأحد الرموز التالية: >، ≤، أو ≥.

المتباينات و الضرب أو القسمة

- a, b, c أعداد ناطقة.
 • إذا كان $a < b$ و $c > 0$ فإن $a \times c < b \times c$
 • إذا كان $a < b$ و $c > 0$ فإن $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

أمثلة:

- إذا كان $z < -12$ فإن $2z < 2 \times (-12)$ أي $2z < -24$
 و $\frac{z}{3} < \frac{-12}{3}$ أي $\frac{z}{3} < -4$

لا يتغير اتجاه متباينة إذا ضربنا طرفيها في نفس العدد.

لا يتغير اتجاه متباينة إذا قسمنا طرفيها على نفس العدد.

- a, b, c أعداد ناطقة.
 • إذا كان $a < b$ و $c < 0$ فإن $a \times c > b \times c$
 • إذا كان $a < b$ و $c < 0$ فإن $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

أمثلة:

- إذا كان $z < -12$ فإن $-2z > 2 \times (-12)$ أي $-2z > -24$
 و $\frac{z}{-3} > \frac{-12}{-3}$ أي $-\frac{z}{3} > 4$



يتغير اتجاه متباينة إذا ضربنا طرفيها في نفس العدد.



يتغير اتجاه متباينة إذا قسمنا طرفيها على نفس العدد.

تطبيقات: تمارين 6 و 7 صفحة 78.

(III) مقارنة عددين ناطقين

- x و y عددين ناطقين.
 مقارنة العددين x و y ترجع إلى دراسة إشارة الفرق $x - y$:
 • $x > y$ يعني $x - y > 0$
 • $x < y$ يعني $x - y < 0$
 • $x = y$ يعني $x - y = 0$

مثال: نريد مقارنة العددين $a = -\frac{11}{12}$ و $b = -\frac{7}{8}$
 من أجل ذلك، ندرس إشارة الفرق $a - b$. لدينا:

$$a - b = -\frac{11}{12} - \left(-\frac{7}{8}\right) = -\frac{11 \times 2}{12 \times 2} + \frac{7 \times 3}{8 \times 3}$$

$$= -\frac{22}{24} + \frac{21}{24} = -\frac{1}{24} < 0$$

إذاً $a - b < 0$ و بالتالي $a < b$ أي $-\frac{11}{12} < -\frac{7}{8}$

تذكير: $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ عددين ناطقين. معناه $a \times d = b \times c$ 

لمقارنة عددين ناطقين، يمكن الاستعانة بعدة طرق: توحيد المقامات ثم مقارنة البسوط، المقارنة بعدد آخر (مثلاً 1)، التعليم على مستقيم مدرج، إلخ...

تطبيقات: تمارين 9 و 17 صفحة 78.

العدد x يحقق المتباينة $-3x + 5 \geq -4$
 استنتج متباينة يكون فيها x هو الطرف الأيسر.

يجب التخلص من 5 في الطرف الأيسر (و ذلك بإضافة معاكسه للطرفين) ثم التخلص من -3 و ذلك بقسمة الطرفين على -3 (مع تغيير اتجاه المتباينة لأن $-3 < 0$).

- ننطلق من المتباينة: $-3x + 5 \geq -4$
- نطرح من طرفيها العدد 5: $-3x + 5 - 5 \geq -4 - 5$
- المتباينة تصبح: $-3x \geq -9$
- نقسم طرفي المتباينة على -3 مع تغيير اتجاه المتباينة لأن $-3 < 0$:

$$\frac{-3x}{-3} \leq \frac{-9}{-3}$$
- نحصل على: $x \leq 3$

$$-2 + 1,4 > -2 + \sqrt{2} > -2 + 1,5 \text{ منه } 1,4 < \sqrt{2} < 1,5 \text{ (د)}$$

$$-0,6 < -2 + \sqrt{2} < -0,5 \text{ أي}$$

$$\frac{-0,6}{3} < \frac{-2 + \sqrt{2}}{3} < \frac{-0,5}{3} \text{ منه}$$

$$-0,20 < \frac{-2 + \sqrt{2}}{3} < -0,16 \text{ أي}$$

تطبيق 3: قرص نصف قطره 3,5 cm.

أعط حصراً لمساحته علماً أنّ $3,14 < \pi < 3,15$.
الحل: لتكن A مساحة القرص. لدينا:

$$A = \pi \times 3,5^2 \text{ cm}^2 = 12,25\pi \text{ cm}^2$$

لكن $3,14 < \pi < 3,15$

$$\text{منه } 12,25 \times 3,14 < 12,25 \times \pi < 12,25 \times 3,15$$

$$38,4650 \text{ cm}^2 < A < 38,5875 \text{ cm}^2 \text{ أي:}$$

تطبيق 4: تمرين 27 صفحة 79

نسبي L طول الملعب، l عرضه و A مساحته.

لدينا: $100 < L < 110$ و $64 < l < 75$

بضرب هذه المتباينات طرفاً لطرف نستنتج أنّ:

$$100 \times 64 < L \times l < 110 \times 75$$

(الأعداد كلها موجبة وبالتالي فاتجاه المتباينات لا يتغير)

$$6400 \text{ m}^2 < A < 8250 \text{ m}^2 \text{ أي}$$

تطبيق 5: تمرين 28 صفحة 79

(1) بما أنّ المدور إلى الجزء من 100 للارتفاع h هو 5,41 فإنّ:

$$5,405 \leq h < 5,415$$

(2) حجم متوازي المستطيلات هو:

$$V = L \times l \times h = 5 \times 3 \times h = 15h \text{ (cm}^3\text{)}$$

و بما أنّ $5,405 \leq h < 5,415$

$$\text{فإنّ } 15 \times 5,405 \leq 15 \times h < 15 \times 5,415$$

$$81,075 \text{ cm}^3 \leq V < 81,225 \text{ cm}^3 \text{ أي}$$

تطبيق 5:

يحمل جهاز كهربائي البيانات التالية: $R = 2500\Omega \pm 5\%$

(1) أعط حصراً للمقاومة الكهربائية R للجهاز.

(2) يمر عبر هذا الجهاز تيار كهربائي شدته $I = 0,088A$

بتطبيق قانون أوم $U = RI$ ، أعط حصراً للتوتر الذي يخضع له الجهاز.

ملاحظة: الرمز Ω يُقرأ «أوم» و A هو الأومبير (Ampère).

الحل:

$$(1) \text{ لدينا: } \left(1 - \frac{5}{100}\right) \times 2500\Omega \leq R \leq \left(1 + \frac{5}{100}\right) \times 2500\Omega$$

$$0,95 \times 2500\Omega \leq R \leq 1,05 \times 2500\Omega$$

$$2375\Omega \leq R \leq 2625\Omega \text{ أي:}$$

$$2375\Omega \leq R \leq 2625\Omega \text{ (2) بما أنّ:}$$

$$0,088A \times 2375\Omega \leq I \times R \leq 0,088A \times 2625\Omega$$

$$209V \leq U \leq 231V \text{ أي:}$$

ملاحظة: الرمز V يُقرأ «فولت» (Volt).



x عدد عشري موجب، مدوّره إلى الوحدة هو 15. لا يمكن للعدد x أن يساوي 14,4 لأن المدور إلى الوحدة للعدد 14,4 هو 14 و ليس 15. ولا يمكن للعدد x أن يساوي 15,5 لأن المدور إلى الوحدة للعدد 15,5 هو 16 و ليس 15. القيم الممكنة للعدد x هي كل الأعداد الأكبر من أو تساوي 14,5 و الأصغر تماماً من 15,5 و نكتب: $14,5 \leq x < 15,5$.
الكتابة الأخيرة تسمى للعدد x .

تطبيق 1: دوري الآن 1 صفحة 77.

بالآلة الحاسبة، نجد أنّ العدد 3,141592654 قيمة مقربة للعدد π أي: $\pi \approx 3,141592654$.

يمكن حصر العدد π بكيفيات مختلفة: (الأعداد المكتوبة بالأحمر تمثل المدور إلى الرتبة المعتمدة).

$$3 < \pi < 4 \leftarrow \text{حصر من المرتبة 0 (رقم بعد الفاصلة)}.$$

(3 هو المدور إلى الوحدة للعدد π).

$$3,1 < \pi < 3,2 \leftarrow \text{حصر من المرتبة 1 (رقم بعد الفاصلة)}.$$

(3,1 هو المدور إلى 0,1 للعدد π).

$$3,14 < \pi < 3,15 \leftarrow \text{حصر من المرتبة 2 (رقم بعد الفاصلة)}.$$

(3,14 هو المدور إلى 0,01 للعدد π).

$$3,142 < \pi < 3,141 \leftarrow \text{حصر من المرتبة 3 (3 أرقام بعد الفاصلة)}.$$

$$3,1416 < \pi < 3,1415 \leftarrow \text{حصر من المرتبة 4 (4 أرقام بعد الفاصلة)}.$$

... إلخ.

مثلاً، في الحصر $3,14 < \pi < 3,15$ ، العدد 3,14 هو القيمة المقربة إلى 0,01 (أي إلى $\frac{1}{100}$) بالنقصان بينما العدد 3,15 هو القيمة المقربة إلى 0,01 (أي إلى $\frac{1}{100}$) بالزيادة.

مثال: قرص طول قطره 7 cm و محيطه P . نريد حصر المحيط P .

نعلم أنّ $P = 7\pi$ و $3,14 < \pi < 3,15$ منه:

$$7 \times 3,14 < 7 \times \pi < 7 \times 3,15 \text{ أي } 21,98 \text{ cm} < P < 22,05 \text{ cm}$$

تطبيق 2:

(1) أعط حصراً من المرتبة 1 للعدد $\sqrt{2}$ (بالآلة الحاسبة).

(2) استنتج حصراً للأعداد التالية:

$$(أ) \sqrt{2} - 3 \quad (ب) \frac{3\sqrt{2}}{3}$$

$$(ج) 3 - 8\sqrt{2} \quad (د) \frac{-2 + \sqrt{2}}{3}$$

الحل:

بالآلة الحاسبة: $\sqrt{2} \approx 1,41421356237$

(1) لدينا: $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$

$$(أ) \quad 1,4 < \sqrt{2} < 1,5 \text{ منه } 1,4 - 3 < \sqrt{2} - 3 < 1,5 - 3$$

$$\text{أي } -1,6 < \sqrt{2} - 3 < -1,5$$

$$(ب) \quad 1,4 < \sqrt{2} < 1,5 \text{ منه } 3 \times 1,4 < 3 \times \sqrt{2} < 3 \times 1,5$$

$$\text{أي } 4,2 < 3\sqrt{2} < 4,5$$

$$(ج) \quad 1,4 < \sqrt{2} < 1,5 \text{ منه } -8 \times 1,4 > -8 \times \sqrt{2} > -8 \times 1,5$$

$$\text{أي } -11,2 > -8\sqrt{2} > -12$$

$$\text{منه } 3 - 11,2 > 3 - 8\sqrt{2} > 3 - 12$$

$$\text{أي } -8,2 > 3 - 8\sqrt{2} > -9$$

$$\text{أي } -9 < 3 - 8\sqrt{2} < -8,2$$