

## متوسطة الشهيد: بن موسى الحاج

### تمارين محلولة في مادة الرياضيات

السنة

# 4

متوسط

### جمع وترتيب الأستاذ: بلعكري عادل

**التمرين (1):** أكتب على أبسط شكل ممكن ما يلي :

$$A = \frac{3}{2} - \frac{1}{5} \times \frac{20}{7}, \quad B = \left( \frac{3}{9} - \frac{6}{48} \right) : \frac{15}{12}, \quad C = \frac{25 \times 10^2 \times 169}{13 \times 500 \times 65}$$

**الحل:**

$$A = \frac{3}{2} - \frac{1}{5} \times \frac{20}{7} = \frac{3}{2} - \frac{1 \times 4}{1 \times 7} = \frac{3}{2} - \frac{4}{7} = \frac{21-8}{14} = \frac{13}{14}$$

$$B = \left( \frac{3}{9} - \frac{6}{48} \right) : \frac{15}{12} = \left( \frac{3:3}{9:3} - \frac{6:6}{48:6} \right) : \frac{15}{12} = \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{8} \right) : \frac{15}{12}$$

$$= \left( \frac{8-3}{24} \right) : \frac{15}{12} = \frac{5}{24} \times \frac{12}{15} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$C = \frac{25 \times 10^2 \times 169}{13 \times 500 \times 65} = \frac{25 \times 10^2 \times 13 \times 13}{13 \times 2 \times 25 \times 10 \times 65} = \frac{13 \times 10}{2 \times 65} = \frac{130}{130} = 1$$

### التمرين (2):

• أحسب القاسم المشترك الأكبر للعدين 729 و 513.

• استنتج الكسر غير القابل للاختزال المساوي

$$\frac{513}{729}$$

**الحل:**

بتطبيق خوارزمية إقليدس (القسمات المتتالية)

$$PGCD(729; 513)$$

$$729 = 513 \times 1 + 216$$

$$513 = 216 \times 2 + 81$$

$$216 = 81 \times 2 + 54$$

$$81 = 54 \times 1 + 27$$

$$54 = 27 \times 2 + 0$$

$$PGCD(729; 513) = 27$$

استنتاج الكسر غير القابل للاختزال المساوي للكسر  $\frac{513}{729}$ .

$$\text{ومنه } \frac{513 : 27}{729 : 27} = \frac{19}{27} \quad \text{إذن الكسر الغير القابل للاختزال هو } \frac{19}{27}$$

### التمرين (3):

لتكن العبارة E حيث :  $E = (2x-5)^2 - 36$

1. تحقق بالنشر أن :  $E = 4x^2 - 20x - 11$

2. حلل العبارة E إلى جداء عاملين .

**الحل:**

1. التحقق بالنشر أن :  $E = 4x^2 - 20x - 11$

$$E = (2x-5)^2 - 36 = (2x)^2 - 2(2x)(5) + 5^2 - 36$$

$$E = 4x^2 - 20x + 25 - 36 = 4x^2 - 20x - 11$$

$$E = 4x^2 - 20x - 11$$

2. تحليل العبارة E إلى جداء عاملين.

$$E = (2x-5)^2 - 36 = (2x-5)^2 - 6^2 = [(2x-5)-6][(2x-5)+6]$$

$$E = (2x-11)(2x+1)$$

1. أنشر وبسط العبارة  $(3x-2)^2$ .

### التمرين (4):

لتكن العبارة الجبرية H حيث:

$$H = (3x-2)(x+1) + 9x^2 - 12 + 4$$

2. حلل H إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى .

3. حل المعادلة  $(3x-2)(4x-1) = 0$

**الحل:**

1. نشر وبسط العبارة  $(3x-2)^2$ .

$$(3x-2)^2 = 9x^2 - 12 + 4$$

$$H = (3x-2)(x+1) + 9x^2 - 12 + 4$$

لتكن العبارة الجبرية H حيث:

2. تحلل H إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى .

$$H = (3x-2)(x+1) + 9x^2 - 12 + 4$$

$$H = (3x-2)(x+1) + (3x-2)^2$$

$$H = (3x-2)(x+1) + (3x-2)(3x-2)$$

$$H = (3x-2)[(x+1) + (3x-2)]$$

$$H = (3x-2)(x+1+3x-2)$$

$$H = (3x-2)(4x-1)$$

3. حل المعادلة  $(3x-2)(4x-1) = 0$

إذن للعبارة حلان هما  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{2}{3}$

### التمرين (5):

(1) علم النقطتين :  $A(3,3)$  و  $B(7,-1)$  في المستوى المزود بمعلم متعامد ومتجانس  $(o, i, j)$

(2) أحسب إحداثيتي N منتصف  $[OB]$

(3) أحسب إحداثيتي C بحيث يكون الرباعي OABC متوازي أضلاع.

(4) أحسب الطولين  $OB$  و  $AC$  ثم استنتج طبيعة الرباعي OABC.

**الحل:**

(1) تعليم النقطتين :  $A(3,3)$  و  $B(7,-1)$  في المستوى المزود بمعلم متعامد ومتجانس  $(o, i, j)$

(2) حساب إحداثيتي N منتصف  $[OB]$  حيث :  $N(x_N; y_N)$

$$N\left(\frac{x_B + x_O}{2}; \frac{y_B + y_O}{2}\right)$$

$$N\left(\frac{7+0}{2}; \frac{-1+0}{2}\right)$$

$$N(3.5; -0.5)$$

(3) أحسب إحداثيتي C بحيث يكون الرباعي OABC متوازي أضلاع

$$(x_B - x_A; y_B - y_A) = (x_C - x_O; y_C - y_O)$$

إذن :  $\overline{AB} = \overline{OC}$  ومنه

$$(7-3; -1-3) = (x_C - 0; y_C - 0)$$

$$\text{ومنه : } \begin{cases} 7-3 = x_C \\ -1-3 = y_C \end{cases} \quad \text{إذن إحداثيات النقطة C هي } C(4; -4)$$

### الجزء الثاني:

الصبغة 1 : دفع 50 دينار للكيلو غرام  
الصبغة 2 : دفع 40 دينار للكيلو غرام إضافة إلى 600 DA .  
تكلمة الجدول :


وزن المنتج ب: (kg)	40	60
المبلغ حسب الصبغة A (ب DA)	2000	3000
المبلغ حسب الصبغة B (ب DA)	2200	3000

### التعبير بدلالة x :

$$f(x) = 50x \quad g(x) = 40x + 600$$

### التمثيل البياني :

$g(x) = 40x + 600$			$f(x) = 500x$		
x	0	60	x	0	60
y	600	3000	y	0	3000
(x, y)	(0, 600)	(60, 3000)	(x, y)	(0, 0)	(60, 3000)



### حل المتراجحة :

$$50x < 40x + 600$$

$$50x - 40x < 600$$

$$10x < 600$$

$$x < 60$$

**التفسير :** تكون الصبغة الأولى أفضل إذا كان عدد الكيلوغرامات أقل من 60 kg .

- إذا كان عدد الكيلوغرامات أقل من 60 فإن الصبغة الأولى هي الأفضل لأن التمثيل البياني للدالة f تقع تحت التمثيل البياني للدالة g .
- أما إذا كان عدد الكيلوغرامات أكبر من 60 فإن الصبغة الثانية هي الأفضل لأن التمثيل البياني للدالة g تقع تحت التمثيل البياني للدالة f .

بالتوفيق والنجاح

1/ عدد تلاميذ القسم هو 42 تلميذ  
2/ كتابة الجدول أعلاه مع تبيان فيه التكرارات المجمعة و مراكز الفئات.  
3/ حساب المتوسط المتوازن لهذه السلسلة الإحصائية .  
$$\bar{x} = \frac{7 \times 2.5 + 12 \times 7.5 + 18 \times 12.5 + 5 \times 17.5}{7 + 12 + 18 + 5} = \frac{17.5 + 90 + 225 + 87.5}{42} = 10$$

4/ عين كلا من :

• مدى كل فئة

$$5 - 0 = 10 - 5 = 15 - 10 = 20 - 15 = 5$$

• الفئة الوسيطة لدينا (N=عدد التكرارات)

$$N = 42 \Rightarrow \begin{cases} \frac{N}{2} = \frac{42}{2} = 21 \\ \frac{N}{2} + 1 = \frac{42}{2} + 1 = 22 \end{cases}$$

إذن القيمة الوسيطة موجودة في الرتبين 21 و 22 وهي :  $10 \leq x < 15$   
• الفئة المتولية لهذه السلسلة الإحصائية

هي التي تقابل أكبر تكرار 18 وهي  $10 \leq N < 15$

### المسألة:

#### الجزء الأول:

بمك فلاح قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها ثلاثة أضعاف عرضها ومساحتها  $67500 \text{ m}^2$

✓ احسب طول وعرض هذه القطعة.

#### الجزء الثاني:

عرس هذا الفلاح قطعة الأرضية بطيخاً .

أثناء بيع المنتج عرض الفلاح على الزبائن صيغتين :

الصبغة A : 50 DA لكل كيلو غرام الواحد .

الصبغة B : 40 DA لكل كيلو غرام الواحد مع إضافة ثمن النقل قدره 600 DA .

1. لنقل ثم أتمم الجدول التالي :

40	وزن المنتج ب (kg)
3000	المبلغ حسب الصبغة A (ب DA)
	المبلغ حسب الصبغة B (ب DA)

ليكن x عدد الكيلو غرامات المبيعة،  $f(x)$  المبلغ المدفوع بالصبغة A،  $g(x)$  المبلغ المدفوع بالصبغة B .

2. عرّس بدلالة x عن  $f(x)$  و  $g(x)$  .

3. في نفس المعلم المتعمد والمتجانس أنشي تمثيلي الدالتين  $f(x)$  و  $g(x)$  .

ملاحظة : (1cm طر مسور الفواصل يمثل 10 كيلو غرام و 1cm طر مسور الزوايا يمثل 1000 DA)

4. حل المتراجحة :  $50x < 40x + 600$  ، ثم قدم تفسيراً لهذا الحل .

5. حسّد من البيان (بالتوضيح) الصبغة الأكثر فائدة للزبون مع الترح .

### الحل:

#### الجزء الأول:

نفرض أن x هو العرض فيكون الطول هو 3x

$$\text{المساحة : } 3x^2 = 67500$$

$$x^2 = 22500$$

معناه  $x = 150$  لأن الأطوال موجبة إذن  $x = -150$  مرفوضة

عرض الحديقة هو 150

طول الحديقة هو 300

4) حساب الطولين OB ، AC

$$AC = \sqrt{(x_c - x_a)^2 + (y_c - y_a)^2} = \sqrt{(4-3)^2 + (-4-3)^2} = \sqrt{1^2 + (-7)^2} = \sqrt{50}$$

$$OB = \sqrt{(x_b - x_o)^2 + (y_b - y_o)^2} = \sqrt{(-1-0)^2 + (7-0)^2} = \sqrt{(-1)^2 + (7)^2} = \sqrt{50}$$

إذن طبيعة الرباعي OABC هو مستطيل لأن القطران AC ، OB متساويين .

### التمرين (6):

أوجد الثنائية التي تكون حل للجملة التالية :

$$\begin{cases} 3x - y = 0 \\ x - y = -24 \end{cases}$$

### الحل:

أيجاد الثنائية التي تكون حل للجملة التالية :

$$\begin{cases} 3x - y = 0 \dots\dots\dots(1) \\ x - y = -24 \dots\dots\dots(2) \end{cases}$$

$$y = 3x \dots\dots\dots(3)$$

من المعادلة (1) نجد :

حساب قيمة x

$$x - 3x = -24$$

$$-2x = -24$$

$$x = 12$$

بتعويض المعادلة (3) في المعادلة (2) نجد :

حساب قيمة y

$$3 \times 12 - y = 0$$

$$y = 36$$

بتعويض قيمة x في المعادلة (1) نجد :

إذن الثنائية (12;36) هي حل لجملة معادلتين.

### التمرين (6):

بيّن الجدول الآتي علامات قسم رابعة متوسط في الفرض الأخير لمادة الرياضيات:

فئات العلامات	$0 \leq x \leq 5$	$5 \leq x \leq 10$	$10 \leq x \leq 15$	$15 \leq x \leq 20$
عدد التلاميذ	07	12	18	5

1) ما هو عدد تلاميذ القسم ؟

2) اكتب جدولاً تبيين فيه التكرارات المجمعة و مراكز الفئات.

3) احسب المتوسط المتوازن لهذه السلسلة الإحصائية .

4) عين كلا من : مدى كل فئة - الفئة الوسيطة - ا لفئة المتولية لهذه السلسلة الإحصائية .

### الحل:

الجدول الآتي علامات قسم رابعة متوسط في الفرض الأخير لمادة الرياضيات:

فئات العلامات	$0 \leq x < 5$	$5 \leq x < 10$	$10 \leq x < 15$	$15 \leq x \leq 20$
عدد التلاميذ	07	12	18	5
التكرار المجمع	7	19	37	42
المساعد				
التكرار المجمع	42	35	23	5
النازل				
مراكز الفئات	$\frac{0+5}{2} = 2,5$	$\frac{5+10}{2} = 7,5$	$\frac{10+15}{2} = 12,5$	$\frac{15+20}{2} = 17,5$