


التمرين 1:

للبحث عما إذا كانت مختلف الاستجابات المناعية تعمل بشكل فعال في الأشهر التي تلي الإصابة بفيروس VIH خلال مرحلة الإصابة بدون أعراض (المرحلة الصامتة من المرض.) نقدم الوثيقة التالية :




الوثيقة : تطور شحنة الفيروس والاستجابات المناعية بعد الإصابة بفيروس VIH

أكتب نصا علميا تبين فيه من خلال الوثيقة تطور فعالية الاستجابات المناعية.

التمرين 2 : 07 نقاط

للتعرف على بعض الخصائص البنيوية والصخرية المميزة لسلاسل الغوص مع إبراز علاقة هذه السلاسل بديناميكية الصفائح نقترح دراسة المعطيات الآتية:

I - تمثل الوثيقة 1 نمودجا مبسطا يفسر بنية سلسلة جبلية من سلاسل الغوص (سلسلة جبال الأنديز)، وتبرز الوثيقة 2 توزيع بؤر الزلازل حسب العمق (الشكل أ) وتوزيع خطوط تساوي درجة الحرارة في هذه المنطقة (الشكل ب) (صحبة الكثافة الصخرية لكل من الليثوسفير المحيطي والليثوسفير القاري (الشكل ج)).





1. تعرف على مختلف البيانات ثم استخراج من مقطع الوثيقة 1 المميزات الصخرية والبنوية لجبال الأنديز .
2. بين من خلال استغلال أشكال الوثيقة 2 (أ ، ب ، ج) أن هذه السلسلة الجبلية ناتجة عن ظاهرة الغوص.

II - للتعرف على الصخور المميزة المناطق الغوص لكل من اللوح الطافي (الراكب) واللوح الغائص (المنغرز) تجري الدراسة التالية:

شروط تشكل الصخور الصهارية المميزة لمناطق الغوص (صخور اندساسية وبركانية) نقدم الوثيقة 3 التي توضح الظروف التجريبية لبداية انصهار صخرة البيريدوتيت المكونة للرداء العلوي (الشكل أ) صحبة مكان تشكل هذه الصخور الصهارية (الشكل ب) حسب العمق ودرجة الحرارة.

للكشف عن مصدر الشرط الضروري لتشكل الصهارة بمنطقة الغوص نتتبع التحولات المعدنية التي تخضع لها صخور القشرة المحيطية (المنغزة) الغائصة (الصخور R1 ، R2 ، R3) الممثلة في الوثيقة 1 ، يقدم الشكل (ج) من الوثيقة 3 مجالات استقرار بعض المجموعات المعدنية بالإضافة إلى ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي تشكلت فيها هذه الصخور R1 ; R2 ; R3 ويبين الشكل (د) من نفس الوثيقة بعض التفاعلات المعدنية المرافقة لتحول هذه الصخور.



1. بين من خلال استغلال الشكلين (أ و ب) للوثيقة 3 ظروف تشكل الصخور الصهارية في مناطق الغوص مبينا الشرط الضروري لتشكل الصهارة.
2. اعتمادا على معطيات الشكلين (ج ، د) للوثيقة 3 ، فسر التغيرات المعدنية التي تحدث عند الانتقال من الصخرة R1 إلى الصخرة R2 ثم من الصخرة R2 إلى الصخرة R3 بمنطقة الغوص.
3. باستغلال معطيات الوثيقة (3) اربط العلاقة بين التغيرات التي تطرأ على اللوح المحيطي المنغرز واللوح الطافي بمنطقة الغوص. و لخص في مخطط مختلف الخواص المميزة لمناطق الغوص


التمرين 3 : 8 نقاط

تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك من الخلية قبل المشبكية إلى الخلية بعد المشبكية

الجزء الأول:

تؤثر بعض سموم الحيوانات و الحشرات و بعض المواد الكيميائية كالمبيدات على انتقال الرسالة العصبية و قصد معرفة تأثيرها على المشبك العصبي العضلي نستعمل التركيب التجريبي المبين في الشكل (أ) الوثيقة -1 من اجل انجاز مجموعة من التجارب.

نطبق تنبيهها فعلا S في شروط تجريبية مختلفة ثم نسجل النتائج الموضحة في الشكل (ب) الوثيقة -1 -



التجارب والنتائج	التسجيل في O ₁	شوارد Ca ⁺⁺ في نهاية قبل مشبكية	كمية الأسيتيل كولين في F1	التسجيل في O ₂
1 تطبيق التنبيه S		+	100 mmol/L	
2 اضافة سم saxitoxine للوسائل الفيزيولوجي ثم نطبق التنبيه S		-	منعدمة	
3 اضافة la concotoxine للوسائل الفيزيولوجي ثم نطبق التنبيه S		-	منعدمة	
4 حقن سم البوتيلينيك في العنصر قبل مشبكي ثم نطبق التنبيه S		+	منعدمة	
5 حقن سم بنغاروتوكسين في الشق المشبكي ثم نطبق التنبيه S		+	100 mmol/L	
6 اضافة مادة carbamate للوسط الفيزيولوجي ثم نطبق التنبيه S		+	190 mmol/L	

1 - باستغلال الوثيقة -1 - حدد موقع تأثير كل مادة على عمل المشبك ، مع التعليل؟


2 - صغ فرضيات تفسر فيها نتائج التجربة 6.

الجزء الثاني:

ان الحركة التنفسية يؤمنها عادة تقلص يليه ارتخاء العضلات التنفسية. يؤثر الكربامات على الجهاز العصبي فيولد اضطرابات تنفسية تصل حتى الاختناق، قصد التأكد من إحدى الفرضيات حول تأثير الكربامات على النقل العصبي، نقدم لك الدراسة التالية:

تمثل الوثيقة - 2 - أ - نتائج تم فيها تسجيل سعة ومدة تقلص العضلة بعد تطبيق التنبيه S السابق و ذلك في وجود و غياب الكربامات ، أما الوثيقة - 2 - ب - فتظهر تأثير الكربامات على إنزيم كولين إستراز.

- مع العلم ان : وسم الكربامات بالفوسفور المشع يظهر تركزه في الشق المشبكي



1. باستغلال الوثيقة - 2 - ، بين كيف يمكن لمادة الكربامات أن تسبب الاضطرابات التنفسية.

2. برهن على مدى صحة إحدى الفرضيات السابقة باستغلالك للوثيقة 1 و 2

الجزء الثالث:

أنجز رسماً تخطيطياً تفسيرياً توضح فيه آلية النقل المشبكي مظهراً تأثير الكربامات على الرسالة العصبية.


إن هناك طريقتين ليكون لديك أعلى مبنى.. إما أن تدمر كل المباني من حولك، أو أن تبني أعلى من غيرك اختر دائماً أن تبني أعلى من غيرك كذلك النجاح.....

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

الاجابة :

تبين الوثيقة من جهة تطور شحنة الفيروس ومن جهة أخرى تطور التفاعلات المناعية (كمية LTC والأجسام المضادة ضد VIH)	المقدمة
تبدأ شحنة الفيروس في الإرتفاع بعد بضعة أسابيع من الإصابة و تصل إلى قيمة قصوى بين شهرين و 2.5 شهر. بعد ذلك , تنخفض شحنة الفيروس ثم تثبت عند مستوى أقل ابتداء من الشهر الرابع . انخفاض شحنة الفيروس يترجم بعض الفعالية للاستجابة المناعية ضد فيروس VIH . الاستجابة المناعية من 0 إلى شهرين : هناك زيادة في كمية LTC (تناسب مع تطور كمية الفيروس) وغياب الأجسام المضادة ضد VIH . على الرغم من العدد المتزايد لـ LTC , الشحنة الفيروسية تستمر في الزيادة : LTC تبدو انها قليلة الفعالية في المقاومة ضد فيروس VIH . الاستجابة المناعية من 2 إلى 2.5 شهر : تصبح الشحنة الفيروسية ثابتة . لحد الآن لا توجد أجسام مضادة . هذا الثبات اذن ناتج عن عمل الـ LTC . الاستجابة المناعية من 2.5 إلى 4 أشهر : خلال هذه المرحلة , تنخفض الشحنة الفيروسية مقارنة مع الحد الأقصى الملاحظ . كمية LTC تبقى ثابتة. عكس ذلك تظهر الاجسام المضادة ضد VIH ابتداء من 2.5 شهر . لذلك فإن هذه الأجسام المضادة تلعب دورا مهما	العرض
في انخفاض شحنة الفيروس . ثبات عدد الأجسام المضادة يتزامن مع تلك لفيروس VIH . خلال هذه المرحلة المبكرة من الإصابة بفيروس VIH (= مرحلة الإصابة + بداية المرحلة بدون أعراض) , ثبات الشحنة الفيروسية عند مستوى منخفض نسبيا يعبر عن فعالية معينة للاستجابة المناعية . فعالية هذه الاستجابة المناعية تعتمد أكثر على عمل الأجسام المضادة من عمل LTC رغم الدور الذي تلعبه الذي لا يمكن إهماله . الاستجابة المناعية ليست فعالة لأن شحنة الفيروس لا تصل تماما إلى مستوى منعدم .	الخاتمة

التمرين 2 :



التمرين الثالث

التجربة 1 (الشاهد) :

- نسجل على مستوى 1 O كمزن عمل (على مستوى اللبف العصبي) وعلى مستوى 2 O2 نسجل كمون عمل (على مستوى الليف العضلي). كما نسجل تواجد شوارد الكالسيوم Ca^{++} في العنصر قبل مشبكي (الزر المشبكي) و كمية الاسيتيل كولين بـ $100mmoles/L$.

التجربة 2 :

- بعد حقن سم الساكسيتوكسين ، نلاحظ عدم تسجيل كمون عمل في 01 O وغياب شوارد الكالسيوم Ca^{++} في العنصر قبل مشبكي (الزر المشبكي) و كمية الاسيتيل كولين كانت منعدمة
- اذن سم الساكسيتوكسين يمنع ان انفتاح القنوات الفولطية وبالتالي ميز الشوارد و منه عدم تسجيل موجة زوال استقطاب.

التجربة 3 :

- بعد حقن سم الكونوتوكسين في الشق المشبكي F ، نسجل في 01 O كمون عمل ، وفي 02 O2 نسجل كمون راحة مع ملاحظة انعدام شوارد Ca^{++} في العنصر قبل مشبكي و غياب الاستيل كولين في الشق المشبكي F .
- سم الكونوتوكسين يمنع دخول شوارد الكالسيوم إلى العنصر قبل مشبكي.

التجربة 4 :

- بعد حقن سم البوتيليك ، نسجل في 01 O كمون عمل وفي 02 O2 كمون راحة مع انعدام شوارد Ca^{++} في العنصر قبل مشبكي و غياب الاستيل كولين على مستوى الشق المشبكي F .
- سم البوتيليك يمنع طرح الحويصلات قبل مشبكية للاستيل كولين.

التجربة 5 :

- بعد حقن سم البنغاروتوكسين نلاحظ تسجيل كمون عمل في 01 O و كمون راحة في 02 O2 مع وجود شوارد Ca^{++} في الزر المشبكي و كمية من الاسيتيل كولين في الشق المشبكي تقدر بـ $100mmoles/L$.

سم البنغاروتوكسين يمنع انفتاح القنوات المبوبة كيميائيا في الخلية بعد مشبكية و بالتالي عدم حدوث الميز الداخلي لشوارد الـ Na^{+} .

التجربة 6 :

- بعد اضافة الكربمات نلاحظ تسجيل كمون عمل في 01 O اما في 02 O2 فنلاحظ تسجيل 3 كمونات عمل الى جانب ظهور شوارد الكالسيوم في الزر المشبكي و كمية كبيرة من الاسيتيل كولين في الشق المشبكي تقدر بـ $190 mmoles/L$

اذن الكربمات يجعل قنوات الكيمياء مفتوحة لمدة اطول.

2 - الفرضيات


- الكربمات يمنع عودة امتصاص الاسيتيل كولين الى الخلية قبل مشبكية
- الكربمات يثبط عمل انزيم الاسيتيل كولين استراز و بالتالي لا يتفكك الاسيتيل كولين.


الجزء 2 :

1 - نلاحظ في الوثيقة 2- أ أن في وجود الكربمات في الوسط تزداد سعة تقلص العضلة و مدة تقلصها اي ان العضلة تبقى متقلصة بسعة اكبر و لمدة اطول كما تظهر الوثيقة 2 - ب ان الكربمات يثبت في الموقع الفعال للاسيتيل كولين استيراز بدل من الاسيتيل كولين اي انه يثبط عمله ومنه تزايد تراكيز الاسيتيل كولين في الشق المشبكي وتثبته في عدد اكبر من المستقبلات القوية وايضا لمد اطول و بالتالي ميز كثيف باستمرار لشوارد Na^+ مؤديا الى تقلص زائد غير عادي لعضلة الحركة التنفسية المتمثلة في عضلة الحجاب الحاجز و البيضلية دون استرخائها مسببا بقاء حجم القفص الصدري و الرئوي في حالة شهيق لمدة طويلة اي هناك امتصاص الـ O_2 دون طرح الـ CO_2 اي عدم العودة الى حالة الزفير و منه حدوث الاضطراب التنفسي حتى الاختناق.

2- البرهان على مدى صحة احدى الفرضيات السابقة

نلاحظ حسب الوثيقة 2 ان الكربمات ينافس الاسيتيل كولين عاى موقعه على مستوى انزيم الاسيتيل كولين استيراز فيثبت بدلا منه مما يؤدي الى تثبيط عمل الانزيم و عدم تفكيك الاسيتيل كولين الذي يبقى في الشق المشبكي بكميات اكبر و لمدة اطول مؤديا الى انفتاح عدد اكبر من الاينوفور و لمدة اطول مسببا ترددات عديدة او كمونات عمل في الحلية بعد مشبكية مسببا تقلص العضلة لمدة اطول و بسعة اكبر وهذا يؤكد صحة الفرضية 2






2. باستغلال معطيات الوثيقتين 2 و 3:
أ. صف (ي) التغيرات العيدانية عند الانتقال من الصخرة R_1 إلى الصخرة R_2 ، ثم حدد (ي) ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي تشكلت فيها كل من هاتين الصخرتين.

ب. فسر (ي) هذه التغيرات العيدانية، ثم استنتج (ي) نمط التحول الذي خضعت له المنطقة المدروسة.

3. اعتمادا على معطيات التمرين، لخص (ي) مراحل تشكل سلسلة جبال الألب.

تقدم الوثيقة 2 الشكل (أ) مثالا لظروف الضغط ودرجة الحرارة الممكنة لتشكل الصخور المتحولة الممثلة في هذا المقطع، ويبين الشكل (ب) من نفس الوثيقة مختلف أنواع التحول حسب مجالات تأثير هاذين العاملين معا.



الإكلوجيت	الشيبست الأزرق	
من 14 إلى 23 kb	من 11 إلى 13 kb	الضغط
من 480 إلى 550 °C	من 320 إلى 520 °C	درجة الحرارة

الشكل (أ)

الوثيقة 2

2. انطلاقا من استغلال معطيات الوثيقة 2، حدد عمق بداية تشكل صخرة الشيبست الأزرق وعمق بداية تشكل صخرة

الإكلوجيت، مع استنتاج نوع التحول الذي خضعت له هذه الصخور.
3. بين كيف تؤكد معطيات الوثيقتين 1 و 2 أن سلسلة جبال عمان ناتجة عن حيز الطمر متبوع بطفو.

التمرين :

التمرين 29

يحتوي الأنزيم (antitrypsin) على 394 حمض أميني، ويمكن التمييز حسب الأشخاص بين شكلين منه: شكل M، يوجد عند الأشخاص العاديين وهو الأكثر انتشاراً حيث يفرض كميات كافية من Aa تحول دون إنلاف خلايا الجسم من طرف الأنزيمات الأخرى التي تعززها دفاعات الجسم ضد الميكروبات.
شكل Z، عند الأشخاص الذين يتوفرون على هذا الشكل لا تفرز إلا كمية ضئيلة من الأنزيم Aa مما يجعل أعضاء هؤلاء الأشخاص تتعرض للإنلاف من طرف الأنزيمات الموجهة ضد الميكروبات. وقد بينت بعض التحاليل أن للشكل M تفرعات سكرية مثبثة على حمض أميني معين من متتالية الأحماض المكونة لهذا الشكل، بينما لا توجد هذه التفرعات في الشكل Z مما يحول دون إفراز كميات كافية منه.


رقم النكليوتيد	340	341	342	343	344	345
الوحدة الرمزية	AUC	CAU	GAG	AAA	GGU	ACU

- اعتماداً على معلوماتك اذكر المكونات الجزيئية لـ ARNm.
- انطلاقاً من معطيات الجدول اكتب متتالية ADN المطابق لجزء ARNm المبين في الجدول.
- اعتماداً على الرمز الوراثي (الوثيقة جانبية) اكتب:
 - متتالية الأحماض الأمينية المطابقة لجزء ARNm المبين في الجدول.
 - متتالية ADN المسؤول عن تركيب الشكل Z: Aa علماً أن للشكلين نفس الأحماض الأمينية باستثناء الحمض الأميني رقم 342 الذي هو Val في الشكل Z.
 - انطلاقاً من إجابتك على السؤالين 2 و 3، قارن بين المورثة المسؤولة عن تركيب الشكل M والمورثة المسؤولة عن تركيب الشكل Z علماً أن تكوينهما الأخرى غير المدروسة متشابهة.
 - سم الظاهرة التي أدت إلى اختلاف المورثتين.
 - حدد بدقة فترة الدورة الخلوية التي يمكن أن تحدث خلالها هذه الظاهرة.
 - استنتج الحمض الأميني الذي تثبت عليه التفرعات السكرية في الشكل M ثم دراسته شكل الأنزيم Aa الملاقة بين "صفة - بروتين" من جهة و "مورثة - بروتين" من جهة أخرى.
 - اعتماداً على المعطيات السابقة وعلى معلوماتك، اشرح ذلك.

الوحدة الرمزية	الحمض الأميني
CAU	حامض الاسبرتيك (Asp)
GAG	حامض كوتاميك (Glu)
GGU	كليسرين (Gly)
AUC	أرولوسين (Ile)
AAA	ليزين (Lys)
ACU	ثريونين (Thr)
GUG	فالين (Val)


التمرين 31

عند تخليط بكتيريات وبلاسميدات جديدة التركيب (ناقلة) - تدمج بعض البكتيريات هذا البلاسميد. وتتم هذه التقنية المسماة "اختيار الخلايا المقيمة" من تحديد البكتيريات المقيمة ورأيها. وتلخص الوثيقة التالية مراحل هذه التقنية.
1 - انطلاقاً من معطيات الوثيقة، حدد مراحل هذه التقنية
2 - حل النتائج الحاصل عليها
3 - بين أهمية مورثة المقاومة لخضاد حيوي معين.



التمرين 32


قصد معالجة بعض أنواع داء السكري، نجحت بعض المقاولات في إنتاج الأنسولين البشري العادي، حيث توصل بعض الباحثين بفعل تقنية الهندسة الوراثية، إلى إنتاج هذا الأنسولين من طرف بكتيرية E.Coli بواسطة أنزيم خاص (أنزيم الفصل) تم فتح البلاسميد البكتيري، كما بين الشكل جانبه. باستعمال نفس الأنزيم، تم عزل جزء من ADN البشري الحامل للمورثة المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، تم دمج هذا ADN بالبلاسميد البكتيري.
1 - لماذا استعمل نفس الأنزيم لفتح ADN البشري، وكذا البلاسميد البكتيري؟
2 - أعط إذن متتالية النكليوتيدات الممثلة لكل طرف من جزء ADN البشري المزول.



التمرين 29

- تتكون ARNm من نكليوتيدات يحتوي كل منها على جزيئة حمض الفسفور وجزيئة الريبوز وإحدى القواعد الأزوتية التالية: أدنين، غوانين، سيتوزين، أوراسيل.
- TAG-GAT-CTC-TTT-CCA-TGA → اتجاه القراءة
- Ile - Asp - Glu - Lys - Gly - Thr - i - 3
TAG - GTA - CAC - TTT - CCA - TGA ب -
- أ - للمورثتين نفس النكليوتيدات باستثناء استبدال T بـ A في النكليوتيد رقم 342 بالنسبة للشكل Z
ب - الطفرة هي المسؤولة عن اختلاف المورثتين
ت - تحدث الطفرة في الفترة S من مرحلة السكون
- تثبت التفرعات السكرية على حمض الكلوتاميك
- عند الأشخاص العاديين يستنسخ ARNm من المورثة، يشرف على تركيب الشكل M الذي يفرض بكمية كافية تحول دون إنلاف أعضاء الجسم من طرف الأنزيمات الموجهة ضد الميكروبات وبالتالي ظهور صفة "عادي". لكن بعد استبدال T بـ A (الإصابة بالطفرة) أصبحت المورثة تشرف على تركيب بروتين يضم Val مكان Glu مما يحول دون تثبيت التفرعات السكرية (الشكل Z) وبالتالي إفراز كمية ضئيلة من aT وظهور صفة إنلاف أعضاء الجسم من طرف الأنزيمات الموجهة ضد الميكروبات.

التمرين :





تمثل أشكال الوثيقتين 1 و 2 نتائج دراسات جيوفيزيائية
للنطقة تماس صفيحة المحيط الهادي بصفيحة أوراسيا على مستوى
الجزر اليابانية :

- 1 - اعط الأسماء المناسبة لأرقام الشكل 1 الوثيقة 2 .
- 2 - استخرج من الشكلين 1 و 2 ثلاث مواصفات أساسية لنوع التماس بين صفيحتي المحيط الهادي وأوراسيا .
- 3 - استنتج نوع التماس بين هاتين الصفيحتين .

4 - اعتمادا على معطيات الشكل 2 وعلى معلوماتك، حدد :

- (أ) قيمة التدفق الحراري في الموقعين E و F .
 - (ب) سبب ارتفاع التدفق الحراري في الموقع F .
- حسب الباحث MIYASHIRO تعرضت صخور صفيحة أوراسيا على مستوى منطقة اليابان إلى تحول، وتبين الوثيقة 3 بعض المناطق التي خضعت لهذا التحول :
- 5 - اعتمادا على معارفك :

- (أ) إعط تعريفا لمفهوم التحول محددًا عوامله .
 - (ب) ذكر بأهمية المعدن المؤشر في دراسة الصخور المتحولة .
- 6 - انطلاقا من معطيات الوثيقة 3 حدد نوع التحول التي خضعت له صخور المنطقة 2 ، علل جوابك .
- 7 - اعتمادا على المعطيات السابقة ، حدد المصدر التكتوني المباشر المسؤول عن نوع التحول الذي خضعت له المنطقة 2 .



الحل

التمرين 4

- 1 - 1 = صفيحة أوراسيا 2 = صفيحة المحيط الهادي 3 = مستوى Benioff و 4 = حفرة محيطية.
- 2 - ثلاثة مواصفات : - وجود حفرة محيطية.
- ظهور بركانية أنديزيتية على مستوى F.
- تشكل مستوى Benioff
- 3 - نوع التماس عبارة عن منطقة طمر.
- 4 - 1 - قيمة التدفق الحراري في الموقع $F = 75 \text{ mw/m}^2$
- قيمة التدفق الحراري في الموقع $E = 45 \text{ mw/m}^2$

ب - يرجع سبب ارتفاع درجة الحرارة في الموقع F إلى النشاط البركاني الأنديزيتي.

5 - أ - تعريف التحول :

هي مجموعة من التحولات في البنية والتركيب المعيداني في الحالة الصلبة لصخور سابقة الوجود تحت تأثير عاملي الضغط والحرارة .

ب - يساهم تقدم المؤشر في تحديد ظروف الضغط والحرارة السائدتين أثناء تشكل الصخرة التي تحتوي على هذا المعدن.

6 - خضعت صخور المنطقة 2 لتحول الطمر أو التحول الدينامي ، لأن عامل الضغط هو الأكثر سيادة وتأثيرا على صخور هذه المنطقة علما أن هذا العامل يرتفع مع العمق في مناطق الطمر وتخفض درجة الحرارة السطحية.

7 - المصدر التكتوني المباشر المسؤول عن تحول الطمر هو انغراز صفيحة المحيط الهادي تحت صفيحة أوراسيا ، حيث يرتفع الضغط مما يتسبب في تحول دينامي.