

**التمرين الأول (10ن)**

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بـ:  $f(x) = \frac{2}{x}$ .

و ليكن  $(\mathcal{C}_f)$  التمثيل البياني للدالة  $f$  في المستوى المنسوب الى معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(I) أدرس تغيرات الدالة  $f$  على  $\mathbb{R}^*$  ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) أحسب  $f(1)$ ،  $f(2)$ ،  $f(-1)$  و  $f(-2)$  ثم بين أنّ  $f(x) = \lambda k(x)$  حيث  $k$  دالة مرجعية يطلب تعيينها و  $\lambda$  عدد حقيقي يطلب تعيينه.

(3) أنشئ  $(\mathcal{C}_f)$  في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(II) لتكن الدالة  $g$  المعرفة كما يلي:  $g(x) = \frac{2+3x}{x}$  و ليكن  $(\mathcal{C}_g)$  تمثيلها البياني في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) بين أنّه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  غير معدوم:  $g(x) = f(x) + 3$ . ثم استنتج أنّ  $(\mathcal{C}_g)$  هو صورة  $(\mathcal{C}_f)$  بتحويل نقطي يطلب تعيين خصائصه.

(2) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة  $g(x) = 0$ . فسر النتيجة بيانياً.

(3) أرسم  $(\mathcal{C}_g)$  في المعلم السابق (استعمل لون آخر).

(III) لتكن الدالة  $h$  المعرفة كما يلي:  $h(x) = \frac{|2+3x|}{x}$  و ليكن  $(\mathcal{C}_h)$  تمثيلها البياني في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أكتب  $h(x)$  دون رمز القيمة المطلقة ثم استنتج طريقة لرسم  $(\mathcal{C}_h)$  انطلاقاً من  $(\mathcal{C}_g)$ .

(2) أنشئ  $(\mathcal{C}_h)$  في المعلم السابق.

**التمرين الثاني (10ن)**

(I) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $g(x) = -4x^3 + 3x^2 + 4x - 3$

(1) تحقق من أن  $a = 1$  جذر لـ  $g(x)$ ، ثم عين كثير الحدود  $q(x)$  بحيث يكون  $g(x) = (x - 1)q(x)$

(2) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة ذات المجهول  $x$ :  $g(x) = 0$

(3) شكل جدول الإشارة لكثير الحدود  $q(x)$  ثم استنتج حلول المتراجحة  $g(x) \leq 0$



(II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $f(x) = -x^4 + x^3 + 2x^2 - 3x + 7$  و ليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) عين  $f'$  مشتقة الدالة  $f$

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) من جدول التغيرات استنتج اشارة الدالة  $f$  على المجال  $[-1, \frac{3}{4}]$

(4) عين معادلة المستقيم  $(\Delta)$  مماس المنحني  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 0

(5) عين عدد نقط  $(C_f)$  التي يكون فيها معامل توجيه المماس يساوي -3



ملاحظة: مقرونية الاجابة ، تنظيم الورقة، اظهار النتائج تؤخذ بعين الإعتبار في التنقيط.

إستعمال القلم الأحمر و المصحح (Effaceur) ممنوع.

وقلم الله

صفحة 2 من 2

2as.ency-education.com

الأستاذ محمد شلغوم